

1. 小叶黑面神(植物分类学报) 山漆茎(植物学名词审查本); 鼠李状山漆茎(科学图版 54: 5—9

Breynia vitis-idaea (Burm. f.) C. E. C. Fischer in Bull. Misc. Inf. Kew 1932: 65. 1932; Airy Shaw in Kew Bull. 26 (2): 227. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 61. 1988. —*Rhamnus vitis-idaea* Burm. f. Fl. Ind. 61. 1768. —*Phyllanthus rhamnoides* Willd. Sp. Pl. 4: 580. 1805. —*Breynia rhamnoides* (Willd.) Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 440. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 330. 1887; Craid in Bull. Misc. Inf. Kew 1911: 461. 1911, et 1912: 187. 1912; Merr. Enum. Philipp. Fl. Pl. 2: 404. 1923; Ridl. Fl. Malay Penins. 3: 218. 1924; Beille in Lec. Fl Gén. Indo-Chiné 5: 636. 1927; 陈嵘, 中国树木分类学 630. 1937. —*B. officinalis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 427. 1894; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 332. 1936; H. Keng in Taiwania 6: 37. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 418. 1963; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 450. 1977; Liu, Ligneous Pl. Taiwan 410. 1976. —*B. accrescens* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 20: 22. 1904; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 332. 1936; H. Keng in Taiwania 6: 37. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 418. 1963; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 450. 1977; C. E. Chang in Journ. Phytogeogr. Taxon. 29(1): 10. 1981. —*B. stipitata* Muell.-Arg. var. *formosana* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Toky 20: 23, tab. 2A, 2B. 1904. —*B. keithii* Ridl. in Journ. Str. Br. Roy. As. Soc. 59: 174. 1911, et Flora 219. 1929. —*B. formosana* (Hayata) Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos. 65. 1916; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 332. 1936; H. Keng in Taiwania 6: 37. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 418. 1963; Liu, Ligneous Pl. Taiwan 410. 1976; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 450, Pl. 682. 1977. —*B. microcalyx* Ridl. in Journ. Fed. Malaya States Mus. 10: 114. 1920.

灌木, 高达 3 米, 多分枝; 枝条纤细, 圆柱状; 节间短; 全株均无毛。叶片膜质, 二列, 卵形、阔卵形或长椭圆形, 长 2—3.5 厘米, 宽 0.8—2 厘米, 顶端钝至圆形, 基部钝, 上面绿色, 下面粉绿色或苍白色; 中脉和侧脉上面扁平, 下面凸起, 侧脉每边 3—5 条; 叶柄长 2—3 毫米; 托叶卵状三角形, 长约 1.5 毫米。花小, 绿色, 单生或几朵组成总状花序; 雄花: 花梗纤细, 长 4—10 毫米; 萼片 6, 阔卵形, 长约 2 毫米, 顶端近截形; 雄蕊 3, 合生呈柱状; 雌花: 花梗长 3—4 毫米; 萼片与雄花的相同, 但较短, 长 1—2 毫米, 结果时不增大; 子房卵珠状, 花柱短。蒴果卵珠状, 顶端扁压状, 直径 5 毫米, 基部有宿存的花萼; 果梗长 3—4 毫米。染色体基数 $x = 26$ 。花期 3—9 月, 果期 5—12 月。

产于福建、台湾、广东、广西、贵州和云南等省区, 生于海拔 150—1 000 米山地灌木丛中。分布于印度、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚和菲律宾等。模式标本采自印度。

全株可药用, 有消炎、平喘之效, 可治哮喘、咽喉肿痛、湿疹等。



1—4.钝叶黑面神 *Breytia retusa* (Dunnst.) Alstons 1.花枝; 2.雄花; 3.雄蕊; 4.雌花。5—9.小叶黑面神 *B. vitis-idaea* (Burm. f.) C. E. C. Fischer: 5.果枝; 6.雄花; 7.雄花,花萼展开示雄蕊; 8.子房横切面,示胚珠着生; 9.蒴果。(黄少容绘)