

2. **钝叶黑面神**(新拟) 小叶山漆茎(中国树木分类学), 枝展黑面神(西藏植物志), 跳八丈(云南临沧), 地石榴(云南思茅) 图版 54: 1—4

Breynia retusa (Dennst.) Alston in Trimen, Handb. Fl. Ceyl. 6(Suppl.):261. 1931; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2): 227. 1972. — *Phyllanthus retusus* Dennst. Schlüss. Hort. Malab. 31. 1818. — *P. pomaceus* Moon, Cat. Ceyl. Pl. 65. 1824. — *P. patens* Roxb. Fl. Ind. 3: 667. 1832. — *Melanthesopsis patens* (Roxb.) Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 437. 1866. — *Breynia patens* (Roxb.) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 67, 277. 1883; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 329. 1887; 陈嵘, 中国树木分类学 630.1937; 西藏植物志 3: fig. 24. 1986.

灌木, 高约 50 厘米; 小枝具四棱; 全株均无毛。叶片革质, 椭圆形, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 7—15 毫米, 顶端钝至圆形, 基部圆形, 上面绿色, 近叶缘处密被小鳞片, 下面粉绿色; 侧脉每边 4—5 条; 叶柄长 1—2 毫米; 托叶卵状披针形, 长约 1 毫米。花小, 黄绿色; 花梗纤细, 长 5—8 毫米; 雄花: 花萼陀螺状, 长 2—3 毫米, 顶端 6 裂; 雄蕊 3, 合生呈柱状, 药隔尖而伸出花药之外; 雌花: 花萼盘状, 顶端 6 裂; 子房 3 室, 每室 2 胚珠, 花柱 3, 粗短。蒴果近圆球状, 直径 8—10 毫米, 果皮肉质, 不开裂, 橙红色, 基部花萼宿存。花期 4—9 月, 果期 7—11 月。


产于贵州(罗田、兴仁)、云南(蒙自、勐腊、景东、思茅、临沧)和西藏(墨脱), 生于海拔 1000—2 000 米山地疏林下或山谷灌木丛中。分布于印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南等。模式标本采自印度东部奥里萨。

根入药, 有小毒, 治妇科疾病, 预防流脑; 叶捣汁, 治湿疹皮炎, 皮肤疮毒等。

3. **黑面神**(生草药性备要) 狗脚刺(生草药性备要), 田中速(岭南采药录), 四眼叶(南京市药材志), 夜兰茶(岭南草药志), 蚁惊树(岭南杂记), 山夜兰(本草求原), 鬼画符(华南), 黑面叶(常用中药手册), 锅盖木(海南澄迈), 漆鼓(广东陆丰), 细青七树(广西上思), 青丸木(广西中草药) 图版 55: 1—6

Breynia fruticosa (Linn.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5:331. 1887, in obs., Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 427. 1894; Beille in Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 632. 1927; Merr. in Sunyatsenia 1: 21. 1930; 广州植物志 268. 1956; 海南植物志 2: 127, fig. 356. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 586, fig. 2902. 1972. — *Andrachne fruticosa* Linn. Sp. Pl. 1014. 1753. — *Phyllanthus lucens* Poir. Eucycl. Meth. Bot. 5: 296. 1804 — *Melanthesa chinensis* Bl. Bijdr. 592. 1825. — *P. turbinatus* Sims in Bot. Mag. 44: tab. 1862. 1826. — *Melanthesopsis lucens* (Poir.) Muell. Arg. in Linnæa 32: 75. 1863. — *Melanthesopsis fruticosa* (Linn.) Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 437. 1866.

灌木, 高 1—3 米; 茎皮灰褐色; 枝条上部常呈扁压状, 紫红色; 小枝绿色; 全株均无



1—6. 黑面神 *Breynia fruticosa* (Linn.) Hook. f.: 1. 花果枝; 2. 雄花; 3. 雄蕊; 4. 雌花; 5. 子房横切面, 示胚珠着生; 6. 蒴果。7—12. 喙果黑面神 *B. rostrata* Merr.: 7. 花枝; 8. 雄花; 9. 雄花萼展开示雌蕊; 10. 雄蕊; 11. 雌花; 12. 蒴果。(黄少容绘)

毛。叶片革质,卵形、阔卵形或菱状卵形,长3—7厘米,宽1.8—3.5厘米,两端钝或急尖,上面深绿色,下面粉绿色,干后变黑色,具有小斑点;侧脉每边3—5条;叶柄长3—4毫米;托叶三角状披针形,长约2毫米。花小,单生或2—4朵簇生于叶腋内,雌花位于小枝上部,雄花则位于小枝的下部,有时生于不同的小枝上;雄花:花梗长2—3毫米;花萼陀螺状,长约2毫米,厚,顶端6齿裂;雄蕊3,合生呈柱状;雌花:花梗长约2毫米;花萼钟状,6浅裂,直径约4毫米,萼片近相等,顶端近截形,中间有突尖,结果时约增大1倍,上部辐射张开呈盘状;子房卵状,花柱3,顶端2裂,裂片外弯。蒴果圆球状,直径6—7毫米,有宿存的花萼。花期4—9月,果期5—12月。

产于浙江、福建、广东、海南、广西、四川、贵州、云南等省区,散生于山坡、平地旷野灌木丛中或林缘。越南也有。模式标本采自我国南部。

枝、叶和茎皮均含鞣质,茎皮中含量为12.02%。叶含酚类与三萜。种子含脂肪油。根、叶供药用,可治肠胃炎、咽喉肿痛、风湿骨痛、湿疹、高血脂病等;全株煲水外洗可治疮疖、皮炎等。

4. 喙果黑面神(海南植物志) 图版 55:7—12

Breynia rostrata Merr. in Philipp. Journ. Sci. Bot. **21**: 346. 1927, et in Lingnan Sci. Journ. **5**: 107. 1927; Chun in Sunyatsenia **1**: 260. 1934; 海南植物志 **2**: 127. 1965.

常绿灌木或乔木,高4—5米,少数可达10米;小枝和叶片干后呈黑色;全株均无毛。叶片纸质或近革质,卵状披针形或长圆状披针形,长3—7厘米,宽1.5—3厘米,顶端渐尖,基部急尖至钝,上面绿色,下面灰绿色;侧脉每边3—5条;叶柄长2—3毫米;托叶三角状披针形,稍短于叶柄。单生或2—3朵雌花与雄花同簇生于叶腋内;雄花:花梗长约3毫米,宽卵形;花萼漏斗状,顶端6细齿裂,直径2.5—3毫米;雌花:花梗长约3毫米;花萼6裂,裂片3片较大,宽卵形,长约3毫米,另3片较小,卵形,顶端急尖,花后常反折,结果时不增大;子房圆球状,长2—3毫米,花柱顶端2深裂。蒴果圆球状,直径6—7毫米,顶端具有宿存喙状花柱;种子长约3毫米。花期3—9月,果期6—11月。

产于福建、广东、海南、广西和云南等省区,生于海拔150—1500米山地密林中或山坡灌木丛中。越南也有。模式标本采自海南五指岭。

根、叶可药用,治风湿骨痛、湿疹、皮炎等。

5. 广西黑面神(拉汉种子植物名称) 小叶黑面神(广西植物名录), 红子仔(广西金秀)

Breynia hyposauropa Croiz. in Journ. Arn. Arb. **21**: 193. 1940.

灌木,高0.5—3.5米;枝条柔细;全株均无毛。叶片纸质或薄纸质,椭圆形,长1.5—3厘米,宽1—1.5厘米,两端钝至圆,有小尖头,上面绿色,下面青灰色;侧脉每边3—5条,纤细,不明显;叶柄长1.5—2毫米;托叶2,小,着生于叶柄基部两侧。花单生或几朵簇生