

星状毛的软刺和红色腺点；种子近球形，直径约 5 毫米，褐色或暗褐色，具皱纹。花期 4—6 月，果期 7—8 月。

产于台湾、浙江和江苏。多生于海拔 320—600 米林中。分布于日本。模式标本采自日本。

种子含油量达 38%，可供工业原料；木材质地轻软，可作小器具用材。

25b. 绒毛野桐 (变种) (植物分类学报) 止血木 (广州)

Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. var. *oreophilus* (Muell. Arg.) S. M. Hwang nom. nov. — *M. oreophilus* Muell. Arg. in *Linnaea* **34**: 188. 1865 et in DC. Prodr. **15** (2): 964. 1866; Airy Shaw in *Kew Bull.* **21**: 387. 1968. — *M. oreophilus* a. *ochraceo-albidus* Muell. Arg. op. cit. — *M. nepalensis* var. *ochraceo-albidus* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm. in *Engl. Pflanzenr.* **63** (N. 147. VII): 166. 1914. — *M. nepalensis* Muell. Arg. var. *kwangtungensis* Croiz. in *Journ. Arn. Arb.* **19**: 136. 1938. — *M. japonicus* (Thunb.) Muell. Arg. var. *ochraceo-albidus* (Muell. Arg.) S. M. Hwang in *Acta Phytotax. Sin.* **23**: 298. 1985. syn. nov. — *M. japonicus* auct. non Muell. Arg.; *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* **7**: 214, 1931. p. p.

本变种与原变种不同点在于叶下面密被淡黄褐色星状绒毛；雌花序总状，不分枝。花果期 6—10 月。

产于云南、四川、贵州、广西、江西和广东。生于海拔 1 300—1 800 米林中。分布于锡金。模式标本采自锡金。

25c. 野桐 (变种) (中国树木分类学) 巴巴树 (湖北)

Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. var. *floccosus* (Muell. Arg.) S. M. Hwang in *Acta Phytotax. Sin.* **23**: 299. 1985. — *M. oreophilus* Muell. Arg. β. *floccosus* Muell. Arg. in *Linnaea* **34**: 188. 1865 et DC. Prodr. **15** (2): 964. 1866. — *M. nepalensis* Muell. Arg. l. c. — *M. tenuifolius* Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* **29**: 429. 1900; Hutch. in *Sargent, Pl. Wils.* **2**: 525. 1916; 陈嵘, 中国树木分类学 618. 图 514. 1937; Croiz. in *Journ. Arn. Arb.* **19**: 1938; 中国高等植物图鉴 **2**: 600. 图 2930. 1972. — *M. nepalensis* Muell. Arg. β *floccosus* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm. in *Engl. Pflanzenr.* **63** (N. 147. VII): 166. 1914. — *M. apelta* (Lour.) Muell. Arg. var. *tenuifolius* (Pax) Pax et Hoffm. op. cit. 171. 1914. — *M. tenuifolius* Pax. var. *floccosus* (Muell. Arg.) Croiz. op. cit. 138. 1938. — *M. tenuifolius* Pax var. *subjaponicus* Croiz. **21**: 502. 1940.

本变种与原变种不同点在于叶下面疏被星状粗毛；雌花序总状，不分枝。花期 7—11 月。

产于陕西、甘肃、安徽、河南、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南和西藏。生于海拔 800—1 800 米林中。分布于尼泊尔、印度、緬