

花柱 2 (—3) 枚, 长 2—3 毫米, 撕裂 15—20 条。蒴果直径 3—4 毫米; 种子近球形, 长 2 毫米。 花期几全年。

产于台湾台东 (兰屿)、屏东 (恒春)。生于低海拔山地常绿林或次生林中。菲律宾、印度尼西亚也有分布。模式标本采自印度尼西亚。

本种群的花序长度, 乃随花期不同而有变化, 叶片大小则与不同植株而异, 不能依此分种, 故将 *A. longiacuminata* 作异名处理。

14. 花莲铁苋菜 (新拟) 花莲铁苋、红头铁苋 (台湾植物志)

Acalypha suirenbiensis Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric. Formos. 5: 178. 1935; H. Keng in Taiwania 6: 32. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 413. 1963; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 443. 1977. — *A. hontauyuensis* H. Keng in Journ. Wash. Acad. Sci. 41 (6): 204. 1951, *syn. nov.* et *op. cit.* 31. 1955; Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. Bot. 6: 302. 1954; Li, *l. c.*; C. F. Hsieh *op. cit.* 442. 1977.

灌木; 嫩枝密被柔毛。叶纸质, 卵形, 长 10—20 厘米, 宽 8—15 厘米, 顶端尾状渐尖, 基部圆钝、近截平或浅心形, 成长叶下面近无毛, 在二级侧脉腋部具一簇粗毛, 边近全缘或具圆锯齿; 基出脉 5 条; 叶柄长 8—20 厘米, 具短柔毛。雌雄异株, 雌花序穗状, 腋生, 长 10—25 厘米, 花序梗长 2—5 厘米, 雌花苞片疏生, 卵形, 长约 1 毫米, 具毛, 花后几不增大, 苞腋具雌花 1 朵; 雌花: 萼片 3 枚, 卵形, 长约 1 毫米; 子房具柔毛, 花柱 3 枚, 长 2.5—5 毫米, 撕裂; 花梗无。雄花序未见。蒴果直径约 4 毫米, 具 3 个分果片; 种子卵圆形, 长约 2 毫米。 花期 7—8 月。

产于台湾花莲和兰屿岛。生于沿海低海拔山坡灌木林中。模式标本采自台湾。

H. Keng (1951) 发表生长于海岛的 *A. hontauyuensis*, 亦仅见具雌花序的标本, 其苞片三角形, 长 1 毫米, 花后不增大, 它与本种的形态特征一致, 故予归并。

组 7. 掌脉组 Sect. *Palminerviae* Muell. Arg. in Linnaea 34: 9. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 805. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (IV. 147. XVI): 142. 1924.

多年生草本, 灌木或小乔木; 雌雄同株, 雌雄花异序, 花序腋生, 雌花序穗状, 雌花苞片, 长 3—5 毫米, 花后稍增大, 具齿或 2 浅裂; 叶具掌状脉。

模式种: 牙买加铁苋菜 *Acalypha hernandiifolia* Sw.

本组约 50 种, 我国产 3 种。

15. 台湾铁苋菜 (新拟) 台湾铁苋 (台湾植物志)

Acalypha angatensis Blanco, Fl. Filip. ed. 1. 750. 1837; Li, Woody Fl. Taiwan 411, f. 151. 1963; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 438, pl. 678. 1977. — *A. formosana* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30: 267. 1911; H. Keng in Taiwania 6: 31. 1955. — *A. grandis* Benth. var. *formosana* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci.

Univ. Tokyo sect. III. Bot. 6: 300. 1954.

灌木；嫩枝被粗毛。叶薄纸质，卵圆形，长18—23厘米，宽13—15厘米，顶端尾状渐尖，基部圆钝或浅心形，边缘具细锯齿，两面均具疏生粗毛；掌状脉5条；叶柄长8—10厘米，具疏毛；托叶卵形，长约8毫米，顶端长渐尖，具短柔毛。雌雄异序，花序腋生，雄花序下垂，苞片小，苞腋具雄花多朵，排成团伞花序；雌花序穗状，长8厘米，花序梗长约1厘米；雌花苞片半圆形，长约5毫米，宽约7毫米，具小齿约10枚，外面具柔毛，苞腋具雌花1朵；雄花：花蕾球形，具柔毛，花萼裂片4枚；雄蕊8枚；花梗具毛；雌花：萼片3枚，卵形，长约0.7毫米，具缘毛；子房具粗毛，花柱3枚，长约4毫米，撕裂。蒴果未见。花期7—8月。

产于台湾中部和南部。生于中海拔山地灌木林中。菲律宾也有分布。模式标本采自菲律宾。

16. 屏东铁苋菜 (台湾植物志)

Acalypha akoensis Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Toyko 30: 266. 1911; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (N. 147. XVI): 152. 1924; H. Keng in Taiwania 6: 30. 1955; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 438, pl. 677. 1977. — *A. grandis* Benth. var. *akoensis* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. Bot. 6: 300. 1954.

小灌木；嫩枝密生柔毛，小枝浅红色，近无毛。叶薄纸质，卵形，长12—16厘米，宽8—11厘米，顶端尾状渐尖，基部浅心形或圆钝的心形，边缘具细锯齿，上面具散生的柔毛，下面沿叶脉被柔毛；掌状脉5条；叶柄长6—9厘米，具密生短柔毛；托叶披针形，长约1.2厘米，具短柔毛。雌雄同株，异序，花序腋生，雄花序长16—20厘米，花序梗长约1厘米，花序轴被柔毛，苞片卵形，疏生，长约0.7毫米，具柔毛，苞腋具雄花多朵，排成团伞花序；雌花序穗状，长5—9厘米，花序梗长约1厘米，花序轴密生柔毛，雌花苞片阔卵形，稍密生，长3—3.5毫米，宽约5毫米，具小齿10枚，外面具柔毛，苞腋具雌花2朵；雄花：花蕾近球形，小，具柔毛；花梗长约1毫米，具疏毛；雌花：萼片3枚，长卵形，长约0.5毫米，外面具柔毛；子房被粗毛，花柱3枚，长2.5—3毫米，撕裂5条。蒴果直径约2.5毫米，具3个分果片，果皮具疏毛。花果期7—10月。

产于台湾中部和南部。生于低海拔山地灌木林中。模式标本采自台湾。

17. 红桑 (广州植物志)

Acalypha wilkesiana Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 817. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (N. 147. XVI): 153. 1924; 广州植物志 277. 1956; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 208. 1972, et in Kew Bull. Add. Ser. IV. 24. 1975.

灌木，高1—4米；嫩枝被短毛。叶纸质，阔卵形，古铜绿色或浅红色，常有不规则的红色或紫色斑块，长10—18厘米，宽6—12厘米，顶端渐尖，基部圆钝，边缘具粗圆