

brasiliensis auct. plur. err. (HBK.) Muell. Arg.: 广州植物志 282, 图 145. 1956; 海南植物志 2: 150, 图 368. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 597, 图 2923. 1972.

大乔木, 高达 30 米, 有丰富乳汁。指状复叶具小叶 3 片; 叶柄长达 15 厘米, 顶端有 2 (3—4) 枚腺体; 小叶椭圆形, 长 10—25 厘米, 宽 4—10 厘米, 顶端短尖至渐尖, 基部楔形, 全缘, 两面无毛; 侧脉 10—16 对, 网脉明显; 小叶柄长 1—2 厘米。花序腋生, 圆锥状, 长达 16 厘米, 被灰白色短柔毛; 雄花: 花萼裂片卵状披针形, 长约 2 毫米; 雄蕊 10 枚, 排成 2 轮, 花药 2 室, 纵裂; 雌花: 花萼与雄花同, 但较大; 子房 (2—) 3 (—6) 室, 花柱短, 柱头 3 枚。蒴果椭圆状, 直径 5—6 厘米, 有 3 纵沟, 顶端有喙尖, 基部略凹, 外果皮薄, 干后有网状脉纹, 内果皮厚、木质; 种子椭圆状, 淡灰褐色, 有斑纹。 花期 5—6 月。

原产巴西; 现广泛栽培于亚洲热带地区; 我国台湾、福建南部、广东、广西、海南和云南南部均有栽培, 以海南和云南种植较多。本种是最主要的天然橡胶植物。

13. 石栗族 Trib. ALEURITIDEAE

Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III, Bot. 6: 309.

1954. — *Chrozophoreae* subtrib. *Irregulares* Pax et Hoffm. in Engl.

Pflanzenr. 57 (N. 147. VI): 11. 1912, ex parte.

花排成聚伞圆锥花序; 花萼开花时不规则 2—3—5 裂, 裂片镊合状排列; 具花瓣; 花丝离生 或短的合生, 无不育雌蕊; 子房 2—6 室, 花柱 2 裂。果为核果状, 稀蒴果, 迟开裂。本族约 4 属, 我国产 3 属。

45. 石栗属 *Aleurites* J. R. et G. Forst.

J. R. et G. Forst. Char. Gen. Pl. 111, t. 56, 1776; Airy Shaw

in Kew Bull. 20: 393. 1966.

常绿乔木, 嫩枝密被星状柔毛。单叶, 全缘或 3—5 裂; 叶柄顶端有 2 枚腺体。花雌雄同株, 组成顶生的圆锥花序, 花蕾近球形, 花萼整齐或不整齐的 2—3 裂; 花瓣 5 枚; 雄花: 腺体 5 枚; 雄蕊 15—20 枚, 排成 3—4 轮, 生于突起的花托上; 无不育雌蕊; 雌花: 子房 2 (—3) 室, 每室有 1 颗胚珠, 花柱 2 裂。核果近圆球状, 外果皮肉质, 内果皮壳质, 有种子 1—2 颗; 种子扁球形, 无种阜。

模式种: 石栗 *Aleurites moluccana* (L.) Willd.

2 种; 分布于亚洲和大洋洲热带、亚热带地区。我国产 1 种。

1. 石栗 (南方草本状) 图版 33: 1—4

Aleurites moluccana (L.) Willd. Sp. Pl. 4: 590. 1805; Muell. Arg. in DC. Prodr.