

3. 海南留萼木 (广西植物)

Blachia chunii Y. T. Chang et P. T. Li in *Guihaia* **8**: 53. 1988.

灌木, 高 1—2 米; 当年生小枝被细柔毛, 老枝无毛, 有时具木栓质狭棱。叶纸质, 倒卵状椭圆形, 长 2—4.5 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 顶端圆形, 稀微凹, 基部阔楔形, 少有近圆形, 全缘, 边缘明显背卷, 两面无毛, 干后下面灰棕色; 侧脉 3—5 对, 在近叶缘处叉开成网状消失; 叶柄长 2—6 毫米。雄花序未见; 雌花 1—4 朵生于小枝顶端或近顶端叶腋, 花梗长约 5 毫米; 萼片 5 枚, 卵状三角形, 长约 1.5 毫米, 被疏柔毛; 子房被疏长柔毛, 后无毛, 花柱 3 枚, 基部 0.5 毫米以下合生, 上部 2 深裂, 线形。蒴果近球形, 直径约 8 毫米, 无毛; 种子椭圆形, 长约 5 毫米, 直径约 2.5 毫米, 暗棕色, 有灰棕色斑纹。花期 6—7 月, 果期 8—9 月。

产于海南。生于沿海低山或海滨干燥疏林中。模式标本采自崖县。

51. 宿萼木属 *Strophoblachia* Boerl.

Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* **3** (1): 235. 1900.

小灌木。叶互生, 全缘, 羽状脉; 具叶柄。花雌雄同株, 异序或同序, 总状花序聚伞状; 短, 顶生; 雄花: 萼片 4—5 枚, 覆瓦状排列; 花瓣 5 枚, 白色, 与萼片等长, 有小齿; 腺体 5 枚, 与萼片对生; 雄蕊约 30 枚, 花药 2 室, 纵裂, 花丝离生; 不育雌蕊缺; 雌花: 萼片 5 枚, 花后增大, 边缘 (有时连背面) 具腺毛; 无花瓣; 花盘坛状, 全缘; 子房 3 室, 每室有 1 颗胚珠, 花柱 3 枚, 基部合生, 上部 2 深裂。蒴果无毛, 具宿存的萼片; 种子有种阜, 子叶宽且扁。

模式种: 宿萼木 *Strophoblachia fimbricalyx* Boerl.

2 种, 有的学者归为 1 种。分布于亚洲东部热带地区。我国有 1 种及 2 变种。

分 种 检 索 表

1. 叶卵状披针形、卵形至倒卵状披针形, 基部阔楔形至近圆形; 嫩枝被很快脱落的疏短柔毛 1. 宿萼木 *S. fimbricalyx* Boerl.
 1. 叶卵形至阔椭圆形, 基部心形, 稀浅心形至近截平; 嫩枝密被微柔毛 2. 心叶宿萼木 *S. glandulosa* Pax var. *cordifolia* Airy shaw
1. 宿萼木 (中国高等植物图鉴)

Strophoblachia fimbricalyx Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* **3** (1): 236, 284. 1900; Pax in *Engl. Pflanzenr.* **47** (IV. 147. III): 36. 1911; Merr. *Enum. Philipp. Fl. Pl.* **2**: 455. 1923, et in *Lingnan Sci. Journ.* **14**: 23. 1935; 海南植物志 **2**: 170, 图 385. 1965, excl. syn. *S. glandulosa* Pax; Airy Shaw in *Kew Bull.* **25**: 544. 1971; 中国高

等植物图鉴 2: 609, 图 2948. 1972. —— *S. glandulosa* Pax var. *tonkinensis* Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 5: 410. 1926; C. Y. Wu et W. C. Wang in Acta Phytotax. Sin 6: 246. 1957.

1a. 宿萼木 (原变种) 图版 38: 1—6

Strophoblachia fimbricalyx* Boerl. var. *fimbricalyx

灌木, 高 2—4 米; 嫩枝灰白色, 被很快脱落的疏生短柔毛, 成长枝无毛, 散生细小皮孔。叶膜质, 卵状披针形、卵形至倒卵状披针形, 长 7—14 厘米, 宽 2.5—5 厘米, 顶端渐尖或尾状渐尖, 稀短尖, 基部阔楔形至近圆形, 全缘, 成长叶两面无毛; 侧脉每边 6—8 条; 叶柄长 1—5 厘米, 嫩时被疏柔毛, 很快变无毛。总状花序聚伞状; 雄花: 萼片卵圆形, 长约 3 毫米; 花瓣倒卵形, 与萼片近等长; 腺体宽且扁; 雄蕊 15—30 枚, 在开花时长于花冠; 雌花: 萼片卵形, 稍不等长, 长 8—10 毫米, 花后增大至 1.5—2 厘米, 边缘密生长 4—5 毫米的粗腺毛; 无花瓣; 花盘环状; 子房 3 室, 花柱 3 枚, 2 深裂。蒴果卵球状, 稍压扁, 直径 8—10 毫米, 具 3 纵沟, 无毛, 红褐色; 种子长约 6 毫米。花期 5—6 月。

产于海南、广西西南部和云南南部。生于海拔 400 米以下的密林中或灌木丛中。分布于越南、菲律宾至印度尼西亚 (苏拉威西)。

模式标本采自印度尼西亚 (苏拉威西)。

1b. 广西宿萼木 (新拟) (变种)

***Strophoblachia fimbricalyx* Boerl. var. *efimbriata* Airy Shaw in Kew Bull. 25: 544. 1971.**

本变种的雌花的萼片果时卵形, 长 1—1.5 厘米, 边缘疏生长 2—2.5 毫米的腺毛。花期 3—10 月。

产于广西西南部。生于山谷密林或灌丛中。模式标本采自龙州。

2. 越南宿萼木 (新拟)

***Strophoblachia glandulosa* Pax in Engl. Pflanzenr. 47 (N. 147. III): 36, f. 10. 1911; Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 5: 409, f. 47, 8—14, f. 48, 1—4. 1926, excl. var. *tonkinensis* Gagnep.; Airy Shaw in Kew Bull. 25: 544. 1971.**

2a. 越南宿萼木 (原变种)

Strophoblachia glandulosa* Pax var. *glandulosa

我国不产。分布于越南南部及柬埔寨。

模式标本采自柬埔寨。

2b. 心叶宿萼木 (变种)

***Strophoblachia glandulosa* Pax var. *cordifolia* Airy Shaw in Kew Bull. 25: 545. 1971, et 26: 341. 1972.**

小灌木, 高 0.5 (—3) 米。嫩枝密被微柔毛, 成长枝灰褐色, 散生细小皮孔, 无毛。