

3. 海南留萼木 (广西植物)

Blachia chunii Y. T. Chang et P. T. Li in *Guihaia* **8**: 53. 1988.

灌木, 高 1—2 米; 当年生小枝被细柔毛, 老枝无毛, 有时具木栓质狭棱。叶纸质, 倒卵状椭圆形, 长 2—4.5 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 顶端圆形, 稀微凹, 基部阔楔形, 少有近圆形, 全缘, 边缘明显背卷, 两面无毛, 干后下面灰棕色; 侧脉 3—5 对, 在近叶缘处叉开成网状消失; 叶柄长 2—6 毫米。雄花序未见; 雌花 1—4 朵生于小枝顶端或近顶端叶腋, 花梗长约 5 毫米; 萼片 5 枚, 卵状三角形, 长约 1.5 毫米, 被疏柔毛; 子房被疏长柔毛, 后无毛, 花柱 3 枚, 基部 0.5 毫米以下合生, 上部 2 深裂, 线形。蒴果近球形, 直径约 8 毫米, 无毛; 种子椭圆形, 长约 5 毫米, 直径约 2.5 毫米, 暗棕色, 有灰棕色斑纹。花期 6—7 月, 果期 8—9 月。

产于海南。生于沿海低山或海滨干燥疏林中。模式标本采自崖县。

51. 宿萼木属 *Strophoblachia* Boerl.

Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* **3** (1): 235. 1900.

小灌木。叶互生, 全缘, 羽状脉; 具叶柄。花雌雄同株, 异序或同序, 总状花序聚伞状; 短, 顶生; 雄花: 萼片 4—5 枚, 覆瓦状排列; 花瓣 5 枚, 白色, 与萼片等长, 有小齿; 腺体 5 枚, 与萼片对生; 雄蕊约 30 枚, 花药 2 室, 纵裂, 花丝离生; 不育雌蕊缺; 雌花: 萼片 5 枚, 花后增大, 边缘 (有时连背面) 具腺毛; 无花瓣; 花盘坛状, 全缘; 子房 3 室, 每室有 1 颗胚珠, 花柱 3 枚, 基部合生, 上部 2 深裂。蒴果无毛, 具宿存的萼片; 种子有种阜, 子叶宽且扁。

模式种: 宿萼木 *Strophoblachia fimbricalyx* Boerl.

2 种, 有的学者归为 1 种。分布于亚洲东部热带地区。我国有 1 种及 2 变种。

分 种 检 索 表

1. 叶卵状披针形、卵形至倒卵状披针形, 基部阔楔形至近圆形; 嫩枝被很快脱落的疏短柔毛 1. 宿萼木 *S. fimbricalyx* Boerl.
 1. 叶卵形至阔椭圆形, 基部心形, 稀浅心形至近截平; 嫩枝密被微柔毛 2. 心叶宿萼木 *S. glandulosa* Pax var. *cordifolia* Airy shaw
1. 宿萼木 (中国高等植物图鉴)

Strophoblachia fimbricalyx Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* **3** (1): 236, 284. 1900; Pax in *Engl. Pflanzenr.* **47** (IV. 147. III): 36. 1911; Merr. *Enum. Philipp. Fl. Pl.* **2**: 455. 1923, et in *Lingnan Sci. Journ.* **14**: 23. 1935; 海南植物志 **2**: 170, 图 385. 1965, excl. syn. *S. glandulosa* Pax; Airy Shaw in *Kew Bull.* **25**: 544. 1971; 中国高