

灰黄色斑纹常不明显，有光泽。 果期 7—8 月。

产于云南西南部。生于海拔 1 400—2 000 米的疏林中。模式标本采自勐海。

### 53. 异萼木属 *Dimorphocalyx* Thw.

Thw. Enum. Pl. Zeyl. 278. 1861; Benth. et Hook. f., Gen. Pl.

3: 301. 1880; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 47 (N. 147. III);

31. 1911.

乔木或灌木，无毛。叶互生，全缘，羽状脉；具叶柄。花雌雄异株，稀同株，花序总状或聚伞状，顶生或腋生，少花的；雄花：花萼杯状，边缘 5 齿或短 5 裂；花瓣 5 枚，离生；腺体 5 枚，与花瓣互生；雄蕊 10—15 枚，外轮 5 枚离生，其余合生成柱状；无不育雌蕊；雌花：花萼 5 深裂，覆瓦状排列，花后增大，宿存；花瓣 5 枚；花盘环状；子房 3 室，每室有 1 颗胚珠，花柱 3 枚，基部合生，顶端各 2 裂。蒴果具 3 个分果片，内果皮壳质。种子具肉质胚乳，子叶宽且扁。

模式种：印斯异萼木 *Dimorphocalyx glabellus* Thw.


约 13 种，分布于亚洲南亚次大陆、中南半岛、马来半岛各国至菲律宾。我国海南产 1 种。

#### 1. 异萼木 (海南植物志) 图版 40: 1—7

*Dimorphocalyx poilanei* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 71: 622, 1924; et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 5: 297, f. 31, 1—2. 1925; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 9: 39. 1930; 海南植物志 2: 169, 图 383. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 608, 图 2946. 1972.

灌木或小乔木，高 3—8 米；茎及老枝常具增厚的软木质树皮，厚 2—5 毫米，并裂成多条狭纵棱，小枝灰白色，无毛。叶革质，长圆形至阔卵形，长 4—8 厘米，宽 2—3.5 (—5) 厘米，顶端短尖至钝圆，基部阔楔形至近圆形，全缘，两面无毛，干后上面色暗，下面棕褐色；侧脉 5—8 对；叶柄长 5—10 毫米；托叶小，长约 1 毫米。花序顶生或腋生，长不超过 1 厘米；雄花：花萼杯状，有 5 个短齿；花瓣 5 枚，长于花萼；腺体 5 枚；雄蕊 10 枚，生于突起的花托上，两轮，内轮 5 枚较长；雌花：萼片长圆形，花后增大；花瓣椭圆形，长约 3 毫米，稍短于萼片；花盘环状，边缘有钝齿；子房近球形，无毛，花柱 3 枚，中部以上 2 裂。蒴果近球状，直径约 1 厘米，无毛，内果皮木质；种子椭圆状，长约 8 毫米，褐色，有斑纹，平滑。 花期 5—12 月。

产于海南南部。生于海边灌木丛中或疏林下潮湿处。越南也有分布。模式标本采自越南。



图版 40 1-7. 异萼木 *Dimorphocalyx poilanei* Gagnep.: 1. 花枝; 2. 雄花蕾; 3. 雄花的雄蕊群和腺体; 4. 花瓣; 5. 雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 果。(余汉平绘)