

5. 长梗三宝木 (广西植物), 普柔树 (静生季刊), 普黍树 (中国种子植物科属辞典)

Trigonostemon thyrsoides Stapf in Kew Bull. Misc. Inf. **1909**: 264. 1909; Pax et Hoffm in Engl. Pflanzenr. **47** (N. 147. III): 91. 1911; Airy Shaw in Kew Bull. **26**: 348. 1972; Y. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. **27**: 150. 1989, *excl. syn. Prosartema stellaris* Gagnep.; H. X. Qiu et X. X. Chen in Guihaia **12**: 212. 1992. — *Prosartema stellaris* auct. non Gagnep.; Hu et al. in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. Ser. **8**: 342. 1938; Chun in Sunyatsenia **4**: 206, f. 40. 1940.

灌木至小乔木, 高 1—5 米; 嫩枝被很快脱落的微柔毛, 枝条无毛。叶纸质, 倒卵状椭圆形、长圆状椭圆形至披针形, 长 16—26 (—32) 厘米, 宽 4—10 (—12) 厘米, 顶端短尖至短渐尖, 基部阔楔形至近圆形, 边缘有不明显疏细锯齿, 齿端有腺, 两面无毛, 干后浅褐色; 侧脉每边 8—13 条; 叶柄长 4—10 厘米, 无毛, 顶端有 2 枚锥状腺体。圆锥花序, 顶生, 长达 20 厘米, 被褐色柔毛; 雄花: 萼片 5 枚, 长约 1.5 毫米, 卵圆形, 外面被疏柔毛; 花瓣 5 枚, 长圆形, 黄色, 无毛, 长 3—4 毫米; 腺体 5 枚; 雄蕊 3—5 枚, 花丝合生, 花药 2 室, 药隔突出, 2 裂; 雌花: 萼片和花瓣与雄花同, 但较大; 花盘环状, 5 裂; 子房无毛, 花柱 3 枚, 短, 2 浅裂。蒴果具 3 深纵沟, 直径约 1.5 厘米, 散生长 1 毫米的皮刺状突起; 果梗棒状, 长约 3 厘米; 种子椭圆状, 有灰色斑纹。花期 4—7 月。

产于云南南部和广西贵州。生于密林中。越南北部也有分布。模式标本采自云南思茅。

6. 黄花三宝木 (广西植物)

Trigonostemon lutescens Y. T. Chang et J. Y. Liang in Guihaia **3**: 173, f. 1, 3—5. 1983, *excl. f. 1, 1—2*; H. X. Qiu et X. X. Chen in Guihaia **12**: 210. 1992, emend.

灌木, 高约 1 米; 嫩枝、叶柄和花序均密被开展的黄褐色柔毛, 成长枝的毛渐脱落。叶纸质, 椭圆形至长圆形, 长 15—23 厘米, 宽 6—8.5 厘米, 顶端渐尖, 有时长渐尖, 基部阔楔形至近圆形, 全缘或具疏生细锯齿, 两面初被柔毛, 后渐脱落; 侧脉每边 8—10 条; 叶柄长 1—3 厘米。圆锥花序, 顶生, 长达 25 厘米, 苞片披针形, 长 3—5 毫米; 雄花: 萼片 5 枚, 卵形, 长 2 毫米, 外面有疏毛; 花瓣黄色, 干后橙红色, 倒卵形, 长 3—5 毫米, 有爪; 雄蕊 3 枚; 雌花: 萼片披针形, 长 5—7 毫米, 外面被柔毛; 花瓣倒卵状椭圆形, 长约 8 毫米, 宽 4—5 毫米, 有爪, 黄色, 干后橙红色; 花盘环状; 子房无毛, 花柱 3 枚, 柱头头状。蒴果近球形, 直径约 1 厘米, 无毛。花期 4—5 月。

产于广西南部。生于石灰岩山地的灌木林中。模式标本采自宁明。

7. 孟仑三宝木 (广西植物) 图版 42: 3

Trigonostemon lili Y. T. Chang in Guihaia **3**: 175. 1983.