

产于广西南部。生于山地密林中。越南北部也有分布。模式标本采自广西防城。

9b. **冯钦三宝木** (变型) (植物分类学报)

Trigonostemon chinensis Merr. form. **fungii** (Merr.) Y. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. 27: 149. 1989. — *T. fungii* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 11: 47. 1932. — *T. chinensis* auct. non Merr.: 海南植物志 2: 174. 1965, quoad syn *T. fungii* Merr.

本变型的成长叶两面被散生长硬毛，基部圆钝；花序较粗壮，被疏生短硬毛，分枝斜上举，较粗。花期 1—4 月。

产于海南。生于山地或河边密林中。模式标本采自琼中。

10. **丝梗三宝木** (植物分类学报) 图版 43: 6—7

Trigonostemon filipes Y. T. Chang et X. L. Mo in Acta Phytotax. Sin. 27: 149. 1989.


灌木，高约 1.5 米。当年生枝被贴伏长硬毛，老枝无毛。叶纸质，卵形、椭圆形至长圆状披针形，长 5—10 (—16) 厘米，宽 (1.5) 2—3 (—4) 厘米，顶端短尖至渐尖，有时尖头骤狭呈尾状，基部阔楔形至近圆形，全缘或有不明显疏细锯齿，齿端有腺，干后两面浅绿色，密生细小疣突，下面沿脉上疏生贴伏硬毛至几无毛；侧脉每边 4—6 条，基出脉有时较明显；叶柄长 0.3—0.5 厘米，疏生贴伏粗硬毛。聚伞圆锥花序生于枝条近顶端，长 3—12 厘米，少花，花序轴细长，纤细，通常 1—3 条聚生于长 2—5 毫米的总花梗上，苞片钻状；花梗长 1—5 (—7) 毫米；雄花的萼片 5 枚，长圆形，长约 2 毫米，外面被疏毛；花瓣 5 枚；近圆形，长 3—4 毫米；黄色；雄蕊 3 枚；雌花未见。蒴果近球形，无毛，直径约 1.5 厘米，具 3 纵沟，果皮薄壳质；果梗棒状，长 1.5 厘米；种子椭圆状，长约 7 毫米。花期 3—8 月。

产于广西西南部和云南东部。生于石灰岩山灌木林中。模式标本采自广西宁明。

55. **轴花木属** *Erismanthus* Wall. ex Muell. Arg.

Wall. ex Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 1138. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 47 (N. 147. III): 33. 1911; Airy Shaw in Kew Bull. 36: 294. 1981.

乔木或灌木。叶对生，二列的，基部偏斜的心形；羽状脉；叶柄短；托叶狭，革质。花雌雄同株，无花盘；雄花序总状，腋生，短，呈球穗花序状，苞片密生，雄花的花梗纤细，开花时极大的伸长；雌花单朵腋生或生于雄花序的基部，花梗短；雄花：萼片 (4—) 5 枚，覆瓦状排列，最后反折；花瓣 (4—) 5 枚，较萼片短；雄蕊 12—15 枚，花



图版 43 1—5. 三宝木 *Trigonostemon chinensis* Merr. form. *chinensis*; 1. 花枝; 2. 雄花蕾; 3. 雄花
花萼; 4. 雄花纵切面; 5. 雌花的雌蕊和一部分萼片和花瓣。6—7. 丝梗三宝木 *T. filipes* Y. T. Chang
et X. L. Mo; 6. 果枝; 7. 果。(邓盈丰绘)