

本种与乌桕 *S. sebiferum* (Linn.) Roxb. 很相似, 但叶片大, 阔卵形, 果序下垂, 长 13—35 厘米, 有时竟达 45 厘米而显然有别。

3. 桂林乌桕 (广西植物名录)

Sapium chihsinianum S. K. Lee in Acta Phytotax. Sin. 5: 121. 1956. — *Sapium discolor* (Champ.) Muell. Arg. var. *wenhsienensis* S. B. Ho. 秦岭植物志 1 (3): 451. 1981. syn. nov.

乔木, 高 5—10 米, 各部均无毛; 枝带灰褐色, 具细纵棱, 有皮孔。叶互生, 纸质, 叶片阔卵形, 长 6—10 厘米, 宽 5—9 厘米, 顶端短渐尖, 基部阔而圆、截平或有时微凹, 全缘, 近叶柄处常向腹面微卷; 中脉两面微凸起, 侧脉 7—9 对, 互生或罕有近对生, 平展或略斜上升, 离缘 2—5 毫米弯拱网结, 网脉明显; 叶柄纤弱, 长 2—6 厘米, 顶端具 2 腺体; 托叶三角形, 长 1—1.5 毫米。花单性, 雌雄同株, 聚集成顶生、长 3—12 毫米的总状花序, 雌花生于花序轴下部, 雄花生于花序轴上部或有时整个花序全为雄花。雄花: 花梗纤细, 长 1—3 毫米; 苞片卵形或阔卵形, 长 1.5—2 毫米, 宽 1.5—1.8 毫米, 顶端短尖至渐尖, 基部两侧各具一肾形的腺体, 每一苞片内有 5—10 朵花; 小苞片长圆形, 蕾期紧抱花梗, 长 1—1.5 毫米, 顶端浅裂或具齿; 花萼杯状, 具不整齐的小齿; 雄蕊 2 枚, 罕有 3 枚, 伸出花萼之外, 花丝分离, 与近球形的花药近等长。雌花: 花梗圆柱形, 粗壮, 长 2—5 毫米; 苞片和小苞片与雄花的相似; 花萼 3 深裂几达基部, 裂片三角形, 长约 2 毫米, 宽近 1 毫米; 子房卵状球形, 3 室, 花柱合生部分与子房近等长, 柱头 3, 外卷。蒴果近球形, 成熟时黑色, 横切面呈三角形, 直径 3—5 毫米, 外薄被白色、蜡质的假种皮。花期 5—7 月。

分布于甘肃南部 (文县)、四川 (城口、巫山、奉节)、湖北 (兴山)、贵州 (兴义、安龙、湄潭)、云南和广西 (龙胜、临桂、凌云)。生于山坡或山顶疏林中。模式标本采自广西临桂雁山。

Sapium discolor (Champ.) Muell. Arg. var. *wenhsienensis* S. B. Ho 详察其拟模式标本 (Paratypus) 魏志平 no. 2830, 叶为阔卵形至卵状圆形, 顶端短尖, 基部钝圆, 与本种毫无差异, 应予归并。

4. 圆叶乌桕 (中国树木分类学) 图版 3: 5—7

Sapium rotundifolium Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 445. 1894; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 52 (N. 147. V.): 241 1912; Dunn et Tutcher in Kew Bull. Misc. Inform. add. ser. 10: 241. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 400. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 212. 1931; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 14: 234. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 613. 1937; S. K. Lee in Acta Phytotax. Sin. 5: 120. 1956; 中国高等植物图鉴 2: 616. 图 1962, 1972; Y. C. Tseng in Acta Phytotax. Sin. 20(1): 106. 1982. — *Baccaurea esquirolii* Lévl. Fl. Kouy-Tchoeu 159. 1914. —