

产于我国台湾(兰屿)。生于沿海珊瑚礁。分布于日本琉球群岛、印度尼西亚诸岛屿直至澳大利亚。模式标本采自印度尼西亚诸岛屿。

标本未见,描述译自 Bot. Bull. Acad. Sin. 32: 227—228, f. 7, 1991.

4. 鹅銮鼻大戟(台湾植物志) 图版 6: 4—7

Euphorbia garanbiensis Hayata, Icon. Pl. Form. 9: 103. 1920; H. Keng in Taiwania 6: 43. 1955; 台湾植物志 3: 462. 1977; Lin et al. in Bot. Bull. Acad. Sin. 32: 227. f. 6. 1991; J. S. Ma & C. Y. Wu in Collect. Bot. 21: 103. 1992. — *Chamaesyce garanbiensis* (Hayata) Hara in Journ. Jap. Bot. 14: 355, 1935; Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo 6 (6): 291, f. 40, 1954; Lin et al. in Bot. Bull. Acad. Sin. 32: 227, f. 6, 1991 et 台湾植物志 ed 2, 3: 433, pl. 225, 1993.

多年生草本。茎自基部多分枝,常呈匍匐状,长20—40厘米,直径仅1—2毫米;茎节略膨大。叶对生,革质,圆卵形至倒卵形,长8—12毫米,宽6—8毫米,先端圆,基部偏斜;具极短的叶柄;托叶短三角形,边缘撕裂,长0.2—0.5毫米;苞叶卵形,长约3毫米,宽约2.5毫米,无柄,边缘具疏锯齿。花序单生于叶腋或枝顶,陀螺状,直径与高均约1毫米,边缘4裂;腺体4,黄绿色,横椭圆形;附属物白色,肾形,全缘或边缘具齿。雄花多枚;雌花1枚;子房光滑无毛;花柱3,分离;柱头2裂。蒴果三角状卵形,直径1.6—2.2毫米,长1.7—2.3毫米,光滑,成熟时分裂为3个分果片,种子灰色、褐色或红色,卵球形,长1—1.1毫米,直径0.6—0.8毫米,具不明显的横向沟槽,腹面具一沟纹,无种阜。花果期不详。

特产于我国台湾恒春(鹅銮鼻半岛)。

组 2. 聚生花序组 Sect. 2. Hypericifoliae Pojero, Fl. Sicula 2 (2) 327. 1907.

草本;茎和分枝斜依向上或近直立;叶纸质;杯状聚伞花序聚生。


组模式种:通奶草 *E. hypericifolia* Linn.

本组我国有4种。

5. 紫斑大戟(植物学汇刊) 图版 7: 5—10

Euphorbia hyssopifolia Linn. Syst. Nat. ed 10, 2: 1048. 1759; J. S. Ma & C. Y. Wu in Collect. Bot. 21: 104. 1992. — *Chamaesyce hyssopifolia* (Linn.) Small in Journ. New York Bot. Gard. 54: 345. 1967; Lin et al. in Bot. Bull. Acad. Sin. 32: 232. f. 9—10. 1991; 台湾植物志 ed 2, 3: 439, pl. 228, 1993.

一年生草本。根纤细,长约6厘米,直径约0.8—1.0毫米。茎斜展或近直立,极少匍匐,无毛,长约15厘米,直径约1毫米。叶对生,椭圆形,长1—2厘米,宽3—5毫米,先端钝,基部偏斜,不对称,近圆形,边缘具稀疏钝锯齿;叶面具数个紫色斑点;叶柄短,长约1.5毫米;托叶平截状,极短,先端唇齿状。花序单一或聚伞状生于叶腋,单



图版 6 1—3. 海滨大戟 *E. atoto* Forst. f.: 1. 植株, 2. 花序, 3. 种子。4—6. 鹅銻鼻大戟 *E. garanbiensis* Hayata: 4. 植株, 5. 花序, 6. 叶 (放大), 7. 种子。(何冬泉绘)