

无腺体；雄花多数，着生于总苞内，无花被，每花仅有1雄蕊，花丝短而与花梗相似，由关节所连接，花药球形，药室内向，纵裂；雌花单生于总苞中央，斜倾，具长梗；子房3室，每室具1胚珠，花柱多少合生，柱头3，2裂。蒴果干燥，分果爿3；种子无珠柄。

约15种，产美洲。我国南部常见栽培的有1种。

1. 红雀珊瑚（广州常见经济植物） 拖鞋花、洋珊瑚（广州）、扭曲草

**Pedilanthus tithymaloides** (Linn.) Poit. in Ann. Mus. Par. 19: 390. t. 19, 1812; Kurz. For. Fl. Brit. Burm. 2: 418. 1877; 广州植物志 265. 1956. ——*Euphorbia tithymaloides* Linn. Sp. Pl. 453. 1753.

直立亚灌木，高40—70厘米；茎、枝粗壮，带肉质，作“之”字状扭曲，无毛或嫩时被短柔毛。叶肉质，近无柄或具短柄，叶片卵形或长卵形，长3.5—8厘米，宽2.5—5厘米，顶端短尖至渐尖，基部钝、圆，两面被短柔毛，毛随叶变老而逐渐脱落；中脉在背面强壮凸起，侧脉7—9对，远离边缘网结，网脉略明显；托叶为一圆形的腺体，直径约1毫米。聚伞花序丛生于枝顶或上部叶腋内，每一聚伞花序为一鞋状的总苞所包围，内含多数雄花和1朵雌花；总苞鲜红或紫红色，仰卧，无毛，两侧对称，长约1厘米，顶端近唇状2裂，一裂片小，长圆形，长约6毫米，顶端具3细齿，另一裂片大，舟状，长约1厘米，顶端2深裂。雄花：每花仅具1雄蕊；花梗纤细，长2.5—4毫米，无毛，其与花丝极相似，为关节所连接；花药球形，略短于花丝。雌花：着生于总苞中央而斜伸出于总苞之外；花梗远粗于雄花者，长6—8毫米，无毛；子房纺锤形，花柱大部分合生，柱头3，2裂。花期12月至翌年6月。

原产美洲。我国云南、广西、广东南部常见栽培，北方温室亦有栽培，供观赏，亦可入药。