

阔三角形,先端钝圆,长约1毫米,边缘具紫红色腺状睫毛,里面被白色微柔毛;花瓣长圆形,长2.5—3毫米,无毛,具褐色脉纹,开花时外卷;雄蕊10,与花瓣近等长,花丝线形,长约1.5毫米,无毛,花药长圆形,长约1毫米;花盘无毛;雄花无不育雌蕊;雌花单生于上部叶腋,较大;子房卵圆形,长约1.5毫米,无毛,5室,花柱长约0.5毫米。核果椭圆形或倒卵状椭圆形,成熟时黄色,长2.5—3厘米,径约2厘米,果核长2—2.5厘米,径1.2—1.5厘米,顶端具5个小孔。

产西藏、云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、福建、浙江、安徽;生于海拔300—2000米的山坡、丘陵或沟谷林中。分布于印度、中南半岛和日本。

生长快、适应性强,为较好的速生造林树种。树皮和叶可提栲胶。果可生食或酿酒。果核可作活性炭原料。茎皮纤维可作绳索。树皮和果入药,有消炎解毒、止血止痛之效,外用治大面积水火烧伤。

1b. 毛脉南酸枣(变种)

var. *pubinervis* (Rehd. et Wils.) Burt et Hill in Ann. Bot. n. ser. 1: 254. 1937. — *Spondias axillaris* Roxb. var. *pubinervis* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 173. 1914; 陈嵘, 中国树木分类学 648. 1937.

小叶背面脉上以及小叶柄、叶轴及幼枝被灰白色微柔毛而与原变种相区别。

产四川、贵州(东部)、湖南(西部)、湖北(西部)、甘肃(东南部);生于海拔400—1000米的疏林中。模式标本采自四川巫溪。

7. 厚皮树属——*Lannea* A. Rich.

A. Rich. in Guillem. Perrottet et Rich. Fl. Seneg. Tent.

1: 153. 1831 (nom. conserv.) — *Calesiam* Adanson, Fam. 2:

446. 1763.

乔木;树皮厚,幼枝常被毛。叶互生,奇数羽状复叶;小叶对生,全缘;花小,单性同株或异株,排列成顶生圆锥花序或总状花序;花萼4裂,裂片在芽中覆瓦状排列;花瓣4,在芽中覆瓦状排列;雄蕊8,生于花盘边缘,花药卵形或箭形,在雌花中雄蕊极短,花药不育;花盘环状;子房4室,每室1胚珠,室顶悬垂,花柱通常侧生,3或4,柱头盾状,在雄花中不育子房存在。核果小,卵形或近肾形,压扁,中果皮薄,内果皮厚,1—4室,先端具残存花柱。

约70种,主产热带非洲,1种产中南半岛至印度尼西亚,我国南部亦有。

1. 厚皮树(中国高等植物图鉴) 十八拉文公、蜜中(海南), 喃木(广西), 万年青、脱皮麻(广东) 图版 27: 1—4

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 353. 1938; Merr. et Chun in Sunyats. 5: 5. 1940, in not.; 云南植物志 2: 379, 图版