

11. 野漆 野漆树(图考), 大木漆(湖北), 山漆树(安徽), 痒漆树(广西、四川、河南), 漆木(广西), 榉仔漆、山贼子(台湾)

Toxicodendron succedaneum (L.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 154. 1891; Moldenke in Phytologia 2: 142. 1946; Tard.-Blot in Aubr., Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 185. 1962; 云南植物志 2: 403. 1979.—*Rhus succedanea* L. Mant. 2: 221. 1771; DC., Prodr. 2: 68. 1825; Benth., Fl. Hongk. 69. 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 12. 1876; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 399. 1883; Franch., Pl. Dav. 1: 79. 1884, et Pl. Delav. 148. 1889; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 147. 1886; Shirasawa, Ic. Ess. For. Jap. 1: 95, t. 57, 1—6. 1900; Hayata, Ic. Pl. Form. 1: 163. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 182. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 199. 1926, et l. c. 8: 155. 1927; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 114. 1927; Edinb. Staff in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 17: 212. 1930; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 636. 1933; Kanehira, Form. Trees. rev. ed. 366, f. 321. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 644, 图 538. 1937; 广州植物志 447. 1956; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 449, f. 174. 1963, et, in Fl. Taiw. 3: 570, Pl. 732. 1977. 中国高等植物图鉴 2: 635, 图 3000. 1972; 海南植物志 3: 108, 图 605. 1974; ——*R. succedanea* var. *japonica* Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 399. 1883; Pierre, Fl. For. Cochinch. 5: t. 373. 1898; Lacte., Fl. Gén. Indo-Chine 2: 36. 1908.—*Augia sinensis* Lour. Fl. Cochinch. 337. 1790, p. p.—**Toxicodendron succedaneum** var. *acuminatum* (Hook. f.) C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 2: 403. 1979, p. p. excl. syn.

11a. 野漆(原变种)

var. *succedaneum*

落叶乔木或小乔木, 高达 10 米; 小枝粗壮, 无毛; 顶芽大, 紫褐色, 外面近无毛。奇数羽状复叶互生, 常集生小枝顶端, 无毛, 长 25—35 厘米, 有小叶 4—7 对, 叶轴和叶柄圆柱形; 叶柄长 6—9 厘米; 小叶对生或近对生, 坚纸质至薄革质, 长圆状椭圆形、阔披针形或卵状披针形, 长 5—16 厘米, 宽 2—5.5 厘米, 先端渐尖或长渐尖, 基部多少偏斜, 圆形或阔楔形, 全缘, 两面无毛, 叶背常具白粉, 侧脉 15—22 对, 弧形上升, 两面略突; 小叶柄长 2—5 毫米。圆锥花序长 7—15 厘米, 为叶长之半, 多分枝, 无毛; 花黄绿色, 径约 2 毫米; 花梗长约 2 毫米; 花萼无毛, 裂片阔卵形, 先端钝, 长约 1 毫米; 花瓣长圆形, 先端钝, 长约 2 毫米, 中部具不明显的羽状脉或近无脉, 开花时外卷; 雄蕊伸出, 花丝线形, 长约 2 毫米, 花药卵形, 长约 1 毫米; 花盘 5 裂; 子房球形, 径约 0.8 毫米, 无毛, 花柱 1, 短, 柱头 3 裂, 褐色。核果大, 偏斜, 径 7—10 毫米, 压扁, 先端偏离中心, 外果皮薄, 淡黄色, 无毛, 中果皮厚, 蜡质, 白色, 果核坚硬, 压扁。