

ssp. radicans

原亚种产美国,我国不产。

15b. 刺果毒漆藤(亚种) 野葛*(抱扑子、唐本草) 图版 35, 2—5

ssp. hispidum (Engl.) Gillis in *Rhodora* 73 (794): 213. 1971; 云南植物志 2: 407, 图版 122, 2—5. 1979.——*Rhus toxicodendron* var. *hispidum* Engl. in Bot. Jahrb. 29: 433. 1900.——*R. intermedia* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 23: 73. 1908, et Ic. Fl. Form. 1: 162. 1911; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 365. 1936.——*R. orientalis* auct. non Schneid., Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 179. 1914; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 448. 1963, et in Fl. Taiw. 3: 569. 1977.

攀援状灌木;小枝棕褐色,具条纹,幼枝被锈色柔毛。掌状3小叶,叶柄长5—10厘米,被黄色柔毛,上面平或略具槽;侧生小叶长圆形或卵状椭圆形,长6—13厘米,宽3—7.5厘米,基部偏斜,圆形,全缘,叶面无毛,叶背沿中脉和侧脉疏被柔毛或近无毛,脉腋具赤褐色髯毛,顶生小叶倒卵状椭圆形或倒卵状长圆形,最宽处在叶的中上部,长8—16厘米,宽4—8.5厘米,先端急尖或短渐尖,基部渐狭;侧生小叶无柄或近无柄,顶生小叶柄长0.5—2厘米,被柔毛。圆锥花序短,长约5厘米,被黄褐色微硬毛;苞片长圆形,长约2毫米,被毛;花黄绿色,花梗长约2毫米,粗壮,被毛;花萼无毛,裂片卵形,长约1毫米或稍长,基部具3条褐色纵脉;花瓣长圆形,无毛,长约3毫米,开花时外卷,具不明显褐色羽状脉;雄蕊与花瓣等长,花丝线形,长约2毫米,花药长圆形,长约1毫米;花盘无毛;子房球形,径约0.5毫米。核果略偏斜,斜卵形,长约5毫米,宽约6毫米,外果皮黄色,被刺毛,刺毛长达1毫米,中果皮蜡质,果核黄色坚硬。

产四川、云南、贵州、湖南、湖北和台湾;生于海拔(630—)1600—2200米的林下。选模式采自四川南川。

本亚种与产美国的原亚种的区别在于:顶生小叶最宽处在叶的中上部,长为宽的2倍,基部楔形,小叶背面具赤褐色髯毛;果压扁,斜卵形,宽约6毫米,被刺毛,刺毛长达1毫米。

本种乳液极毒,易引起漆疮。

13. 三叶漆属——*Terminthia* Bernh.

Bernh. in *Linnaea* 22: 134. 1938.——*Searsia* F. A. Barkl. in Amer. Midl. Nat. 28: 472. 1942, in clavi sine descr. lat.——*Rhus* L., Sp. Pl. 265. 1753, p. p.; Engl. in DC. Monog. Phan. 4;

*“野葛”这一名称极易与豆科葛藤属的种类相混,故中名另行新拟。



1.石山漆 *Toxicodendron calcicolum* C. Y. Wu ex T. L. Ming: 1.花枝。2—5.刺果毒漆藤 *Toxicodendron radicans* (L.) O. Kuntze ssp. *hispidum* (Engl.) Gillis: 2.花枝; 3.花; 4.雄蕊; 5.果。(李锡畴绘)