

全缘,呈皱波状,两面无毛,叶面具光泽,叶背苍白色,侧脉15—20对,斜升,与边缘脉相连接,在叶面凹陷,叶背突起,网脉两面突起;叶柄长1—2厘米,粗壮,上面具槽。圆锥花序或总状花序长2—10厘米,疏被微柔毛或近无毛;花小,杂性;苞片三角状卵形,长约0.5毫米;花梗长约1.5毫米;花萼无毛,裂片钝三角形,长、宽约0.7毫米;花瓣卵形或阔卵形,直立,长2.5—3毫米,宽约1.7毫米,无毛;雄蕊着生在花盘基部,花丝钻形,长约0.5毫米,花药短心形,丁字着生,药室内向纵裂;雄花无不育雌蕊,两性花中子房下位,椭圆状,径约2.5毫米,无毛,花柱长约1毫米。果椭圆状,径约2厘米,果肉具纤维质,多树脂,果核革质;种皮膜质。

产云南东南部;生于海拔130—900米的山谷或沟边密林中。分布于不丹、锡金、印度东北部、缅甸及越南北部。

2. 大果辛果漆(云南植物志) 图版37: 7

Drimycarpus anacardiifolius C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 2: 413, 图版124, 7. 1979.

乔木,高达15米;小枝四棱形,黄褐色,无毛,具黄色小皮孔。叶厚革质,倒卵形,长9—11.5厘米,宽5.8—6.4厘米,先端平截或微凹,基部渐狭,全缘,略反卷,两面无毛,叶面绿色,具光泽,中脉粗,在叶面平,叶背极突起,具细条纹,侧脉8—9对,水平伸展达边缘,在叶面略显,叶背突起;叶柄粗壮,扁平,长约2.5厘米,无毛,基部暗褐色。花未见。果序总状,腋生或顶生,比叶短,长4—6厘米(连果),序轴和果梗无毛,具细小突起皮孔,果梗长约1.5厘米;果近球形,径约2.5厘米,黄绿色,无毛,具多数纵棱。

产云南西南部;生于海拔680—700米的沟谷密林中。模式标本采自云南沧源。

近于辛果漆 *D. racemosus* (Roxb.) Hook. f., 但叶为倒卵形,先端平截或微凹,果大,径约2.5厘米。

5. 九子母族——Trib. Dobineace Engl.

Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 177. 1896.


灌木或亚灌木状草本。单叶互生或对生。花雌雄异株,雌花无花被,单心皮的子房贴在大的叶状苞片中部,花梗与苞片中脉合生,果为增大的苞片所托。

本族我国有1属。

16. 九子母属——*Dobinea* Buch.-Ham. ex D. Don

D. Don, Prodr. Fl. Nep. 249. 1825; Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 177. 1896.——*Podoon* Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 1: 681. 1887.

灌木或多年生具肥大根状茎的亚灌木状草本。单叶互生或对生,具长柄,不分裂,羽



1—2. 小果肉托果 *Semecarpus microcarpa* Wall.: 1. 花枝; 2. 雄花。3—6. 辛果漆 *Drimycarpus racemosus* (Roxb.) Hook. f.: 3. 果序; 4. 叶; 5. 花; 6. 雄蕊。7. 大果辛果漆 *Drimycarpus anacardiifolius* C. Y. Wu et T. L. Ming: 7. 果枝。(李锡畴绘)