

边缘全缘，稍反卷，有时稍微波状，叶面无毛，叶背除沿中脉散生小茸毛和脉腋稍有白色茸毛外，其余无毛，侧脉6—7对；叶柄长4—11毫米。聚伞圆锥花序分叉少而常呈总状，长约2.5厘米，总花梗通常长5—10毫米；花小，淡黄绿色，4数，雌雄异株；雄花直径约1毫米，花萼与花瓣2轮紧接，具缘毛；雄蕊着生花盘边缘，花丝长约0.7毫米，退化雌蕊细小。雌花未见。果实卵形，长5毫米，红色或充分熟透时呈黑色；种子每室1—2，直立。花期6月，果期8—9月。


产于四川峨眉、南川、奉节等县。生长于海拔500—900米的林下或林缘。模式标本采自峨眉山。

3. 台湾核子木（中国高等植物图鉴） 图版44：7

Perrottetia arisanensis Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 26. t. 4. 1915; D. Hou in *Taiwania* 1: 193. 1950; H. L. Li, *Woody Fl. Taiwan* 475. 1963; 中国高等植物图鉴 2: 687. 1972.

小乔木或灌木；小枝无毛。叶互生，椭圆状长方形、窄卵形或窄椭圆形，长5—16厘米，宽2—5厘米，先端尾状渐尖，常向一侧偏斜，呈镰状弯曲，边缘具尖锯齿；叶柄长0.5—1.5厘米。聚伞花序宽松呈圆锥状腋生，长2—4.5厘米；花4数，单性，雌雄同株。浆果略扁球形，长1.5毫米，直径1.7毫米，2室，每室具2种子。

特产我国台湾。生长于山坡水边的丛林边缘，海拔约650—2500米。模式标本采自阿里山。



图版 44 1—3. 十齿花 *Dipentodon sinicus* Dunn: 1. 花枝, 2. 果序, 3. 果放大. 4. 长梗十齿花 *D. longipedicellatus* C. Y. Cheng et J. S. Liu: 叶. 5—6. 核子木 *Perrottetia racemosa* (Oliv.) Loes.: 5. 果枝, 6. 花放大. 7. 台湾核子木 *P. arisanensis* Hayata: 果枝. (林子拼抄自宗维城)