

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、浙江、湖北、安徽、江苏、四川。生于路旁、山地或丛林中。

种子油可制肥皂及油漆。茎皮可作纤维。据分析,种子含油 17.57%。

2. 膀胱果 大果省沽油(峨眉植物图志)

Staphylea holocarpa Hemsl. in Kew Bull. Misc. Inform. 1895: 15. 1895 et 1910: 175. 1910; Bean, Trees & Shrubs 2: 549. 1915; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 185. 1916; Lévl., Cat. Pl. Yunnan 267. 1917; W. Y. Chun, Chin. Econ. Trees 224. 1921; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 1. 1934.——*Xanthoceras enkianthiflora* Lévl. in Fedde, Rep. Spec. Nov. 12: 534. 1913 et Fl. Kouy-Tcheou 384. 1915.——*Tecoma cavaleriei* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 50. 1914.

2a. 膀胱果(原变种) 图版 5: 4—5

Staphylea holocarpa Hemsley var. **holocarpa**

落叶灌木或小乔木,高 3—5(—10) 米,幼枝平滑,三小叶,小叶近革质,无毛,长圆状披针形至狭卵形,长 5—10 厘米,基部钝,先端突渐尖,上面淡白色,边缘有硬细锯齿,侧脉 10,有网脉;侧生小叶近无柄,顶生小叶具长柄,柄长 2—4 厘米。广展的伞房花序,长 5 厘米,或更长,花白色或粉红色,在叶后开放。果为 3 裂、梨形膨大的蒴果,长 4—5 厘米,宽 2.5—3 厘米,基部狭,顶平截;种子近椭圆形,灰色,有光泽。

产陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、西藏东部。

2b. 玫红省沽油

Staphylea holocarpa Hemsley var. **rosea** Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 186. 1916.

与原变种不同处在于花玫瑰粉红色。

产于湖北西部(房县)、四川、云南东南部(蒙自,标本未见)。

花玫瑰红色,可供观赏。

本种与 *S. bumalda* DC. 不同处在于顶端小叶柄极长,蒴果梨形,三裂。

3. 腺齿省沽油

Staphylea shweliensis W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 13: 184. 1921; 云南植物志 2: 353. 1979.

乔木或灌木,高 6—9 米,小枝无毛。叶为三小叶,叶轴长 4—6 厘米,托叶显著,长 2.3 厘米,线状披针形,膜质,小叶近相等,椭圆形,长 6—8 厘米,宽 3—3.5 厘米,先端长渐尖,基部宽楔形,膜质,边缘具整齐的具腺体的锯齿,上面绿色,无毛,背面较淡,或近粉白,无毛,侧脉 5—6,可见。中间小叶柄长约 1.5 厘米,侧生小叶柄长约 3 毫米。花序生于一年生枝顶端,长 5—6 厘米,有 20—30 朵花,花梗长 4—6 厘米,小花柄长约 8 毫米,苞片线