

形,长2—3毫米,花苍白至黄色,花萼长圆形,长约8毫米,花瓣倒卵形,与花萼近相等,雄蕊花丝疏被柔毛,花柱2,和子房疏被较长微柔毛。果未见。

据原描述,产云南(怒江),北纬 $25^{\circ}21'$,海拔2700米的丛林中。

本种近似 *Staphylea emodi* Wall., 但叶有具腺体的锯齿,且花较小,故可区别。

4. 嵩明省沽油 枫树(云南) 图版5: 6—7

Staphylea forrestii Balf. f. in Not. Bot. Gard. Edinb. 13: 183. 1921; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 665. 1933; 云南植物志 2: 353. 1979.

乔木,高(8—)10—17米,老枝深黄褐色,具纵条纹,无毛。叶对生,叶轴长4—7厘米,淡灰褐色,无毛,小叶3,稀为5,纸质,长圆状椭圆形或长卵形,长(6—)8—10厘米,宽(2.5—)3.5—4.5厘米,先端长渐尖,基部宽楔形,边缘微反折,具锯齿,上面深绿色,无毛,背面色淡,向基部脉腋(中脉两侧)疏生白色微柔毛,余无毛,主脉在两面明显,侧脉6—7,与网脉在两面明显;侧生小叶柄长2—3毫米,中间小叶柄长(1—)2.5—3.5厘米。总状花序腋生,花多数,小花柄长4—5(—8)毫米,有小托叶,托叶线形,花长9—12毫米;花萼5,线状三角形,长7—9毫米,基部宽约4毫米,两面无毛或外面基部疏被柔毛,花瓣5,着生于花盘边缘,匙形,长约9毫米,两面无毛,雄蕊5,与花瓣对生,生于花瓣内侧基部,花丝长约7毫米,基部无毛,花药长约2毫米,花柱3,长(连子房)约7毫米,基部极疏被白色柔毛,柱头头状,子房1室,胚珠多数。果实长4.5—6.5厘米,宽2—3.5厘米,圆柱状钟形,基部浑圆;种子长5—7毫米,有光泽,榄绿色至黄色。花期5月,果期8月。

产云南(嵩明)、四川(会东)、广东(乳源)、贵州。生于海拔2380—2700米的干燥山坡上。

3. 野鸦椿属——*Euscaphis* Sieb. et Zucc.


Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1: 124. t. 67. 1835.

落叶灌木或小乔木,平滑无毛;芽具二鳞片。叶对生,有托叶,脱落,奇数羽状复叶,小叶革质,有细锯齿,有小叶柄及小托叶。圆锥花序顶生,花两性,花萼宿存,5裂,覆瓦状排列,花盘环状,具圆齿,雄蕊5,着生于花盘基部外缘,花丝基部扩大,子房上位,心皮2—3,裂片全裂,成为一室,无柄,花柱2—3枚,在基部稍连合,柱头头状,胚珠2列,蓇葖1—3,基部有宿存的花萼,展开,革质,沿内面腹缝线开裂,种子1—2,具假种皮,白色,近革质,子叶圆形。

3种,产日本至中南半岛。我国产2种。

分种检索表

1. 圆锥花序;蓇葖果外面肋脉明显;叶长卵形。…………… 1. 野鸦椿 *E. japonica* (Thunb.) Dippel
1. 聚伞花序;蓇葖果外面肋脉不明显;叶较狭。…………… 2. 福建野鸦椿 *E. fukienensis* Hsu



1—3. 省沽油 *Staphylea bumalda* DC.: 1. 花枝; 2. 花展开 (除去花萼); 3. 果。4—5. 膀胱果 *Staphylea holocarpa* Hemsley var. *holocarpa*: 4. 叶; 5. 果。6—7. 嵩明省沽油 *Staphylea forrestii* Balf. f.: 6. 花枝; 7. 花展开 (除去花萼)。(李锡畴绘)