

*Acer chunii* Fang in *Sunyatsenia* 3: 263, t. 33. 1937 & in *Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China Bot. ser.* 11: 51. 1939.

15a. 乳源槭(原亚种)

*Acer chunii* Fang subsp. *chunii*

落叶小乔木, 高约 7 米。树皮深褐色, 平滑。小枝细瘦, 圆柱形, 深褐色, 具皮孔。叶纸质, 卵形, 较大的叶长 7—9 厘米, 宽 4—5 厘米, 稀达 7 厘米, 较小的叶长不逾 4 厘米, 宽 2.5 厘米, 先端锐尖具尾状尖头, 基部圆形, 不分裂或 2—3 裂, 分裂者两侧的裂片有时大小不等, 上面深绿色, 干后绿褐色, 下面淡绿色, 初生脉 3 条由基部生出, 在上面不显著, 在下面显著, 侧脉 3—4 对, 细小, 在下面显著; 叶柄细瘦, 长 3—4 厘米。花的特性未详。果序伞房状, 长 6 厘米, 无总果梗或有长仅 3 毫米的总果梗。小坚果紫红色, 压扁状, 长圆卵形, 长 10 毫米, 宽 6 毫米; 翅长圆形, 连同小坚果共长 2.5—3 厘米, 宽 6—7 毫米, 展开成钝角或近于水平; 果梗细瘦, 长 2—3 厘米。花期不明, 果期 9 月。

产广东北部。生于海拔 800—1200 米的疏林中。模式标本采自乳源。

15b. 两型叶乳源槭(亚种)(植物分类学报)

*Acer chunii* Fang subsp. *dimorphophyllum* Fang in *Act. Phytotax. Sin.* 17 (1): 68, Pl. 9: 3. 1979.

本亚种与原种的区别在于本亚种的叶比较细瘦, 3 裂和不分裂者同生, 3 裂者长 10—11 厘米, 宽 7—8 厘米, 基部近于圆形, 中央裂片近于卵形, 先端尾状锐尖, 侧裂片近于三角形, 先端锐尖或尾状锐尖, 不分裂者近于长圆卵形, 长 8—9 厘米, 宽 3.5—4 厘米, 基部近于圆形或稍倾斜, 先端长尾状锐尖, 叶柄较短, 长 5—7 厘米, 果序伞房状, 长约 4 厘米, 细瘦, 无总果梗, 淡紫色, 无毛, 翅果细瘦, 长 2—2.8 厘米, 小坚果压扁状, 直径 5 毫米, 翅近于倒卵形或镰刀形, 宽 5—8 毫米, 张开成钝角。花期不明, 果期 9 月。

产四川西南部。生于海拔 1000—1500 米的疏林中。模式标本采自峨边。

16. 阔叶槭(植物分类学报) 高大槭(植物分类学报), 黄枝槭(中国树木分类学)

*Acer amplum* Rehd. in *Sargent, Pl. Wils.* 1: 85. 1911; Fang in *Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser.* 11: 53. 1939. — *A. cappadocicum* subsp. *amplum* (Rehd.) E. Murr. *Kalmia* 8: 3. 1977.

16a. 阔叶槭(原变种)

*Acer amplum* Rehd. var. *amplum*

落叶高大乔木, 高 10—20 米, 稀达 25 米。树皮平滑, 黄褐色或深褐色。小枝圆柱形, 无毛, 当年生枝绿色或紫绿色, 多年生枝黄绿色或黄褐色; 皮孔黄色, 圆形或卵形。冬芽近于卵圆形或球形, 紫褐色, 鳞片覆叠, 钝形, 外侧无毛, 边缘纤毛状。叶纸质, 基部近于心脏形或截形, 叶片的宽度常大于长度, 常宽 10—18 厘米, 长 9—16 厘米, 常 5 裂, 稀 3 裂或不分裂; 裂片钝尖, 裂片中间的凹缺钝形; 上面深绿色或黄绿色, 嫩时有稀疏的腺体, 下面淡