

米的灌木林中。模式标本采自湖北巴东。

5. 阿里山清风藤(台湾木本植物志)

Sabia transarisanensis Hayata, Icon. Fl. Formos. **5**: 31. t. 5. 1915; Sasaki, List Pl. Formos. 278. 1928; Kaneh. Formos. Trees ed 2. 418. 1936; L. Chen in Sargentia **3**: 19. 1943; Li, Woody Fl. Taiwan 505. 1963. et Fl. Taiwan **3**: 598. 1977.——van de Water in Blumea **26**: 26. 1980. pro syn. sub nom. *S. campanulata* Wall.

攀援木质藤本;小枝绿色,有纵条纹。芽鳞三角状圆形,长约1毫米。叶膜质,卵状长圆形或长圆形,长4—6厘米,宽2—3厘米,先端尖或短渐尖,基部楔形或阔楔形,全缘或具不明显的小锯齿,两面均无毛;侧脉每边5—6条,在近叶缘处向上弯拱网结,网脉明显;叶柄长4—6毫米,有柔毛。聚伞花序有花1—2朵,生于当年生枝的叶腋;萼片5,绿色,长圆形,长2—2.5毫米,宽1—2毫米,先端圆钝,有脉纹;花瓣5—6片,紫色,长圆形或倒卵状长圆形,长5毫米,宽2.5毫米,先端圆,有5条脉纹;雄蕊5—6枚,稍短于花瓣,花丝扁平,长约2.5毫米,花药球形,长约1毫米;花盘肿胀,枕状,高长于宽,基部最宽;子房圆锥形,无毛。花期4月,果期7—8月。

产我国台湾(阿里山)。生于海拔1550—3300米的山林边缘或灌木丛中。模式标本采自台湾阿里山。

组2. 清风藤组——Sect. *Sabia*——Sect. *Odontodiscus* L. Chen in Sargentia **3**: 15. 1943.

花盘浅杯状,不肿胀,不肥厚,边缘有不规则浅齿、深裂或深裂至基部,但决不全缘。

6. 清风藤(图经本草) 寻风藤(本草纲目) 图版31: 1—5

Sabia japonica Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. **11**: 430. 1867. Franch. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris **5**: 230. 1883; Hance in Journ. Bot. **21**: 296. 1883; Forb. et Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 143. 1886; Pei in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China. Bot. ser. **9**: 175. 1934; 陈嵘, 中国树木分类学 726. 图 618. 1937; L. Chen in Sargentia **3**: 34. 1943; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 466. 图 758. 1959; 中国高等植物图鉴 **2**: 726. 图 3181. 1972; van de Water in Blumea **26**: 37. 1980.——*S. bullockii* Hance in Journ. Bot. **16**: 9. 1878.——*S. sp.* Rehd. et Wils. in Journ. Arn. Arb. **8**: 164. 1927.——*S. japonica* Maxim. var. *spinosa* Lecomte in Bull. Soc. Bot. France **54**: 673. 1907. in nota.——*S. spinosa* Stapf ex Anon. in Acta Phytotax. Geobot. **5**: 78. 1936. nom. nud.

落叶攀援木质藤本;嫩枝绿色,被细柔毛,老枝紫褐色,具白蜡层,常留有木质化成单刺状或双刺状的叶柄基部。芽鳞阔卵形,具缘毛。叶近纸质,卵状椭圆形、卵形或阔卵形,长3.5—9厘米,宽2—4.5厘米,叶面深绿色,中脉有稀疏毛,叶背带白色,脉上被稀疏柔毛,侧脉每边3—5条;叶柄长2—5毫米,被柔毛。花先叶开放,单生于叶腋,基部有苞片4