

枚，苞片倒卵形，长2—4毫米；花梗长2—4毫米，果时增长至2—2.5厘米；萼片5，近圆形或阔卵形，长约0.5毫米，具缘毛；花瓣5片，淡黄绿色，倒卵形或长圆状倒卵形，长3—4毫米，具脉纹；雄蕊5枚，花药狭椭圆形，外向开裂；花盘杯状，有5裂齿；子房卵形，被细毛。分果片近圆形或肾形，直径约5毫米；核有明显的中肋，两侧面具蜂窝状凹穴，腹部平。花期2—3月，果期4—7月。

产江苏、安徽、浙江、福建、江西、广东、广西。生于海拔800米以下的山谷、林缘灌木林中。日本也有分布。

植株含清风藤碱甲等多种生物碱，供药用，治风湿、鹤膝、麻痹等症。

6a. 中华清风藤(拉汉种子植物名称)

Sabia japonica Maxim. var. ***sinensis*** (Stapf) L. Chen in *Sargentia* **3**:36. 1943.——

S. sinensis Stapf ex Anon. in *Acta Phytotax. Geobot.* **5**: 78. 1936.

本变种与原变种不同之处，在于本变种的花梗及子房均无毛。

产广东北部及江西西南部。生于海拔500米上下的山地、路旁疏林中。模式标本采自广东北部。

7. 紫花清风藤(新拟)

Sabia purpurea Hook. f. et Thoms. *Fl. Ind.* **1**: 209. 1855; Hook. f. *Fl. Brit.*

Ind. **2**: 2. 1876.

落叶攀援木质藤本，长达4.5米，叶长圆形，长圆状卵形或近披针形，长3—12厘米，宽1.5—4.5厘米；聚伞花序长达4.5厘米，具花3—6朵；花瓣长3—4.5毫米；雄蕊长1.5—1.75毫米；雌蕊长1.3—1.7毫米。

产尼泊尔(模式标本产地)、印度东北部、孟加拉西部、缅甸及泰国。我国不产。

7a. 灌丛清风藤(拉汉种子植物名称) 图版31: 6—11

Sabia purpurea Hook. f. et Thoms. subsp. ***dumicola*** (W. W. Smith) van de

Water in *Blumea* **26**: 54. 1980.——*S. dumicola* W. W. Smith in *Not. Bot. Gard. Edinb.*

10: 63. 1917; L. Chen in *Sargentia* **3**: 40. fig. 3. 1943.——*S. parvifolia* L. Chen, op.

cit. **49**. 1943.——*S. acuminata* L. Chen l. c.

落叶攀援木质藤本，长2—6米；小枝纤细，绿色，有纵条纹，无毛。芽鳞阔卵形，先端尖，无毛。叶膜质，长圆状卵形或狭卵形，长1.5—6厘米，宽1—3厘米，先端急尖或渐尖，基部阔楔形或圆钝，两面均无毛；侧脉每边3—4条，向上弯拱网结，网脉稀疏；叶柄长2—4毫米。聚伞花序长1—2厘米，有花3—10朵，与叶同时开放，总花梗长0.8—1厘米，花梗长3—4毫米；花紫绿色、紫色或深红色，直径3—5毫米；萼片5，大小稍不相等，卵形或近圆形，长0.5—1毫米，边缘具细圆齿；花瓣5片，椭圆形或卵形，长2—3毫米，先端钝或圆，有5条脉纹，上半部有红色斑点；雄蕊长约1毫米，花丝扁平，花药外向或内向开裂；花盘杯状，裂片深裂至近基部，肉质；雌蕊长约1毫米，子房无毛。分果片倒卵形，长约7毫米；