

10. 灰背清风藤(中国高等植物图鉴) 图版 33: 1—7

Sabia discolor Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **38**: 358. 1908; Merr. et Chun in Sunyatsenia **1**: 68. 1930; L. Chen in Sargentia **3**: 45. 1943; 中国高等植物图鉴 **2**: 726. 1972; van de Water in Blumea **26**: 34. 1980.

常绿攀援木质藤本;嫩枝具纵条纹,无毛,老枝深褐色,具白蜡层。芽鳞阔卵形。叶纸质,卵形,椭圆状卵形或椭圆形,长4—7厘米,宽2—4厘米,先端尖或钝,基部圆或阔楔形,两面均无毛,叶面绿色,干后黑色,叶背苍白色;侧脉每边3—5条;叶柄长7—1.5厘米。聚伞花序呈伞状,有花4—5朵,无毛,长2—3厘米,总花梗长1—1.5厘米,花梗长4—7毫米;萼片5,三角状卵形,长0.5—1毫米,具缘毛;花瓣5片,卵形或椭圆状卵形,长2—3毫米,有脉纹;雄蕊5枚,长2—2.5毫米,花药外向开裂;花盘杯状;子房无毛。分果片红色,倒卵状圆形或倒卵形,长约5毫米;核中肋显著凸起,呈翅状,两侧面有不规则的块状凹穴,腹部凸出。花期3—4月,果期5—8月。

产浙江、福建、江西、广东、广西等省区。生于海拔1000米以下的山地灌木林间。模式标本采自福建。

11. 平伐清风藤(新拟) 图版 33: 8—15

Sabia dielsii Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 456. 1911; Fl. Kouy-Tch'cou 379. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 9. 1934; L. Chen in Sargentia **3**: 51. 1943; van de Water in Blumea **26**: 33. 1980.——*S. brevipetiolata* L. Chen, op. cit. 50. 1943.——*S. olacifolia* Stapf ex L. Chen, op. cit. 52. 1943.——*S. wangii* L. Chen, op. cit. 51. 1943.

落叶攀援木质藤本,长1—2米;嫩枝黄绿色或淡褐色,老枝紫褐色或褐色,有纵条纹,无毛。芽鳞质厚,三角形或三角状卵形。叶纸质,卵状披针形,长圆状卵形或椭圆状卵形,长6—12(14)厘米,宽2—6厘米,先端渐尖或常弯成镰刀状,基部圆或阔楔形,叶面深绿色,干后榄绿色,叶背淡绿色,两面均无毛;侧脉每边4—6条,网脉稀疏;叶柄长3—10毫米。聚伞花序有花2—6朵,总花梗长1.5—3厘米,花梗长5—10毫米;萼片5,卵形,长0.5—1毫米,花瓣5片,卵形或卵状椭圆形,长2—3毫米,宽1.5—2毫米,先端圆,有脉纹;雄蕊5枚,花药内向开裂;花盘杯状;子房卵球形。分果片近肾形,长4—8毫米;核无中肋,两侧面有明显的蜂窝状凹穴,腹部平。花期4—6月,果期7—10月。

产云南中部以南、贵州东南部至西南部、广西北部。生于海拔800—2000米的山坡、溪旁灌木丛中或森林的边缘。模式标本采自贵州。

12. 尖叶清风藤(新拟) 图版 34: 1—7

Sabia swinhoei Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 144. 1886; Diels in Engler. Bot. Jahrb. **29**: 451. 1900; Hayata, Ic. Pl. Formos. **1**: 160. 1911; Sasaki, List Pl. Formosa 278. 1928; Hand.-Mazz. Sym. Sin. **7**: 643. 1933; L. Chen in Sargentia



1—7. 灰背清风藤 *Sabia discolor* Dunn: 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花; 4. 花去花被, 示花盘和雌蕊; 5. 雄蕊; 6. 花去花被, 示雄蕊和雌蕊; 7. 分果片。8—15. 平伐清风藤 *Sabia dielsii* Lévl.: 8. 花枝; 9. 果枝; 10. 分果片; 11. 花; 12. 花去花被, 示雄蕊和雌蕊; 13. 花去花被示花盘和雌蕊; 14. 雄蕊; 15. 花瓣。(冯钟元绘)