

倒卵形,顶端微凹;花梗长 1.5—4 毫米,被疏毛或无毛。核果圆柱形,长 7—9 毫米,直径 3—4.5 毫米,成熟时红色或桔红色,干后变黑色或紫黑色;果梗长 3—5 毫米,被疏柔毛或无毛。花期 5—7 月,果期 7—10 月。

产陕西南部、山西南部、河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北西部。生于海拔 1100 米以下的山坡、路旁或林中。日本、朝鲜也有分布。

根供药用,治痔疮;皮含绿色染料。

C. K. Schneider (1914) 依据采自湖北房县和江西九江的标本 (Wilson 3389, 1515) 发表的 *R. obovalis* Schneid. 认为该种叶下面或沿脉被密短柔毛,花较少数,果桔红色和叶倒卵形,与本种相区别。但从检查上述地区的大量标本中,发现本种在叶形,毛被和花的数目等均有较大的变异,甚至在同产地的标本也常有很大的变异,因此,该种并入本种作为异名是比较适宜的。

2. 毛背猫乳 (新拟)

Rhamnella julianae Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 223. 1914.

灌木,高 3—5 米;幼枝绿色,被绒毛或短柔毛,小枝黑褐色,具少数不明显的皮孔。叶纸质,近椭圆形或卵状矩圆形,长 4—8 厘米,宽 2—4 厘米,顶端短渐尖或长渐尖,基部圆形或近心形,稍偏斜,边缘具细锯齿,上面暗绿色,近无毛,下面灰绿色,被绒毛或密柔毛,或仅被短柔毛,侧脉每边 6—8 条;叶柄长 2—5 毫米,被绒毛或短柔毛。花黄绿色,两性,2—4 个排成腋生聚伞花序;萼片宽卵形,顶端尖;花瓣宽倒卵形,顶端微凹,稍长于雄蕊。核果近圆柱形,长 7 毫米,直径 4 毫米,成熟时紫红色;果梗长 3.5—4.5 毫米。花期 5 月,果期 6—8 月。

产湖北(竹溪)、四川、云南。生山坡林下,海拔 1000—1600 米。模式标本采自四川汶川。

本种幼枝被绒毛或短柔毛,叶下面及叶柄均有绒毛或密短柔毛,与本属的其余的种类极易识别。

3. 尾叶猫乳 (新拟) 图版 27: 4—5

Rhamnella caudata Merr. et Chun in Sunyats. 2: 11. 1934.

灌木或小乔木,高达 4 米;幼枝无毛或近无毛。叶近椭圆形,稀倒卵状椭圆形或倒卵状矩圆形,长 7—15 厘米,宽 3—5.5 厘米,顶端尾状长渐尖,基部近圆形,稍偏斜,边缘具浅锯齿,两面无毛或仅下面沿脉被疏短疏毛,侧脉每边 7—10 条;叶柄长 4—6 毫米,无毛或被疏短柔毛。花黄绿色,两性,6—10 个排成腋生或顶生聚伞花序,无毛;总花梗长 3—5 毫米,花梗长 2—3 毫米。核果近圆柱形,长 8—9 毫米,直径 4—5 毫米,黄绿色,成熟时变黑色或紫黑色;果梗长约 4 毫米。花期 5—6 月,果期 7—8 月。

产广东北部(乳源)。生于山坡混交林中,或散生于路旁、田边。模式标本采自广东乳源。

4. 卵叶猫乳 (新拟) 小叶猫乳(中国高等植物图鉴) 图 26: 3

Rhamnella wilsonii Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 2: 22. 1914; 中国高等植