

长不超过 9 毫米,直径 3.5—4 毫米,与本种显然不同。

10b. 大老鼠耳(变种)(云南)

*Berchemia hirtella* Tsai et Feng var. *glabrescens* C. Y. Wu ex Y. L. Chen in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 13. 1979.

叶形和核果的特征与原变种相同,惟叶下面无毛或仅沿脉被疏短柔毛,或脉腋有簇毛,叶柄无毛,与后者不同。

产云南(镇康、瑞丽、勐海)、贵州(安龙)。生于海拔 1300 米的林中。模式标本采自云南镇康。

11. 大叶勾儿茶(浙江) 胡氏勾儿茶(黄山植物的研究)

*Berchemia huana* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 166. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 671. 1933; 徐炳声,黄山植物的研究 145. 1965.

11a. 大叶勾儿茶(原变种)

*Berchemia huana* Rehd. var. *huana*

藤状灌木,高达 10 米;小枝光滑无毛,绿褐色。叶纸质或薄纸质,卵形或卵状矩圆形,长 6—10 厘米,宽 3—6 厘米,上部叶渐小,顶端圆形或稍钝,稀锐尖,基部圆形或近心形,上面绿色,无毛,下面黄绿色,被黄色密短柔毛,干后栗色,侧脉每边 10—14 条,叶脉在两面稍凸起;叶柄长 1.4—2.5 厘米,无毛。花黄绿色,无毛,通常在枝端排成宽聚伞圆锥花序,稀排成腋生窄聚伞总状或聚伞圆锥花序,花序轴长可达 20 厘米,分枝长可达 8 厘米,被短柔毛,花梗短,长 1—2 毫米,无毛;花芽卵球形,顶端骤然收缩成短尖。核果圆柱状椭圆形,长 7—9 毫米,直径 4 毫米,熟时紫红色或紫黑色,基部宿存的花盘盘状;果梗长 2 毫米。花期 7—9 月,果期翌年 5—6 月。

产安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北。常生于海拔 1000 米以下的山坡灌丛或林中。模式标本采自安徽九华山。

此种与毛背勾儿茶 *B. hispida* (Tsai et Feng) Y. L. Chen et P. K. Chou 均为顶生宽聚伞圆锥花序;花序轴及叶下面被毛,但后者的叶厚纸质,侧脉每边 12—17 条,上面下陷,下面明显凸起;叶柄较长,与本种不难区别。两种在分布上也各异。

11b. 脱毛大叶勾儿茶(变种)(东北林学院植物研究室汇刊)

*Berchemia huana* Rehd. var. *glabrescens* Cheng ex Y. L. Chen in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest Inst. 5: 13. 1980.

仅以叶下面沿脉或侧脉下部被疏短柔毛,与原变种相区别。

产安徽(黄山)、浙江(天目山、建德、平溪)。模式标本采自浙江天目山。

12. 毛背勾儿茶(新拟) 图版 32: 5

*Berchemia hispida* (Tsai et Feng) Y. L. Chen et P. K. Chou in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 14. 1979.——*B. hypochrysa* Schneid.