

1b. 灰毛蛇葡萄 (植物分类学报) (变种) 毛叶蛇葡萄 (秦岭植物志)

A. bodinieri (Lévl. & Vant.) Rehd. var. **cinerea** (Gagnep.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 23. 1934 et Man. Cult. Trees & Shrubs 616. 1940; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 89. 1979 in clavi; 秦岭植物志 **1** (3): 268. 1981; 云南种子植物名录上册 790. 1984; 河南植物志 **2**: 601. 1988. — *Vitis lyjoannis* Lévl. in Bull. Soc. Bot. France. **54**: 369. 1907. — *A. heterophylla* (Thunb.) Sieb. & Zucc. var. **cinerea** Gagnep. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 101. 1911. — *A. micans* Rehd. var. **cinerea** Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **21**: 189. 1912. — *V. heterophylla* auct. non Thunb. (1784): Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 27. 1914 p. p.

本种与原变种不同在于叶片下面被灰色短柔毛。

产陕西、湖南、四川。生山坡灌丛或林中，海拔约 1 300 米。模式标本采自湖北西部长乐 (Chang-lo)。

2. 异叶蛇葡萄 (植物分类学报)

Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. **4** (2): 197. 1815 — *Vitis heterophylla* Thunb. Fl. Jap. 103. 1784. — *A. humulifolia* Bge. var. **heterophylla** (Thunb.) Koch, Hort. Dendr. 48. 1853; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **17** (3): 89. 1979 in clavi; Guihaia **8** (2): 113. 1988; 福建植物志 **3**: 380. 1988. — *A. regeliana* Carr. in Rev. Hort. **1866**: 440. 1866. — *V. heterophylla* Thunb. var. **humulifolia** Hook. f. in Bot. Mag. **93**: tab. 5682. 1867. excl. syn. Bge. — *V. heterophylla* Thunb. var. **maximowiczii** Regel in Gartenff. **22**: 197. t. 765. f. 2. 1873. — *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. **heterophylla** (Thunb.) Hara, Enum. Sperm. Jap. **3**: 133. 1954; Czer. Add. Crr. Fl. URSS 581. 1973. — *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. **maximowizii** Rehd. in Gent. Herb. **1**: 36. 1920; 中国高等植物图鉴 **2**: 778. 1972. — *A. humulifolia* auct. non Bge. (1835); 福建植物志 **3**: 379. 图 266. 1988.

2a. 异叶蛇葡萄 (原变种)

Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Sieb. & Zucc. var. **heterophylla**

木质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，被疏柔毛。卷须 2—3 叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为单叶，心形或卵形，3—5 中裂，常混生有不分裂者，长 3.5—14 厘米，宽 3—11 厘米，顶端急尖，基部心形，基缺近呈钝角，稀圆形，边缘有急尖锯齿，上面绿色，无毛，下面浅绿色，脉上有疏柔毛，基出脉 5，中央脉有侧脉 4—5 对，网脉不明显突出；叶柄长 1—7 厘米，被疏柔毛；花序梗长 1—2.5 厘米，被疏柔毛；花梗长 1—3 毫米，疏生短柔毛；花蕾卵圆形，高 1—2 毫米，顶端圆形；萼碟形，边缘波状浅齿，外面疏生短柔毛；花瓣 5，卵椭圆形，高 0.8—1.8 毫米，外面几无毛；雄蕊 5，花药长椭圆形，长