

产福建、广东、广西。生溪边林中，海拔 50—400 米。越南北部也有分布。

本种在标本馆中常与翼茎白粉藤 *C. pteroclada* Hayata 相混，并被认为与之相近，实际上两者相差甚远，本种小枝明显有 6 棱翅，茎节部收缩干时易脆断，叶卵状三角形，基部大多近截形，果实近球形，种子近圆形，表面光滑，无尖锐突起棱纹。

3. 白粉藤（海南植物志）

Cissus repens Lamk. Encycl. 1: 31. 1783; Planch. in DC. Monogr. Phan. 5: 504. 1887; Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 354. 1911 et Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine. 1: 970. 1912 et in Humbert, Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine. 1: 887. 1950; Craib, Fl. Siam. Enum. 1: 308. 1926; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 121. 1927; 广州植物志 423. 1956; 海南植物志 3: 18. 1974; 台湾植物志 3: 671. 1977; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 88. 1979 in clavi; Momiyama in Hara & Williams, Enum. Fl. Pl. Nep. 2: 94. 1979; 云南种子植物名录上册 795. 1984; 福建植物志 3: 373. 1988. ——*Cissus cordata* Roxb. Fl. Ind. ed. 2. 1: 407. 1832; Benth. Fl. Honk. 54. 1861. ——*Vitis repens* Wight & Arn. Prodr. 1: 125. 1834; Laws. in Fl. Brit. Ind. 1: 646. 1875.

草质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，常被白粉，无毛。卷须 2 叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶心状卵圆形，长 5—13 厘米，宽 4—9 厘米，顶端急尖或渐尖，基部心形，边缘每侧有 9—12 个细锐锯齿，上面绿色，下面浅绿色，两面均无毛；基出脉 3—5，中脉有侧脉 3—4 对，网脉不明显；叶柄长 2.5—7 厘米，无毛；托叶褐色，膜质，肾形，长 5—6 厘米，宽 2—3 厘米，无毛。花序顶生或与叶对生，二级分枝 4—5 集生成伞形；花序梗长 1—3 厘米，无毛；花梗长 2—4 毫米，几无毛；花蕾卵圆形，高约 4 毫米，顶端圆钝；萼杯形，边缘全缘或呈波状，无毛；花瓣 4，卵状三角形，高约 3 毫米，无毛；雄蕊 4，花药卵椭圆形，长略甚于宽或长宽近相等；花盘明显，微 4 裂；子房下部与花盘合生，花柱近钻形，柱头不明显扩大。果实倒卵圆形，长 0.8—1.2 厘米，宽 0.4—0.8 厘米，有种子 1 颗；种子倒卵圆形，顶端圆形，基部有短喙，表面有稀疏突出棱纹，种脐在种子背面下面 1/4 处与种脊无异，种脊突出，腹部中棱脊突出，向上达种子上部 1/3 处，侧洼穴呈沟状，达种子上部。花期 7—10 月，果期 11 月至翌年 5 月。

产广东、广西、贵州、云南。生山谷疏林或山坡灌丛，海拔 100—1 800 米。越南、菲律宾、马来西亚和澳大利亚也有分布。

4. 粉果藤（海南植物志）

Cissus luzoniensis (Merr.) C. L. Li in Chin. J. Appl. Environ. Biol. 2 (1): 49. 1996. ——*Cissus repens* Lamk. var. *luzoniensis* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 9 (3): 131. 1916. ——*C. glaberrima* auct. non (Wall.) Planch. (1887); Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 121. 1927. excl. Kwangsi; 海南植物志 3: 18. 1974; W. T.