

毛。 花期夏秋季间,果期冬季。

产于海南。生长于山地疏林或密林中。模式标本采自海南五指山脚下。

3. 毛破布叶(新拟)

Microcos stauntoniana G. Don Gen. Syst. 1:551. 1831. — *Grewia microcos* sensu Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1:392. 1874, non Linn., pro parte; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 1:534. 1911, pro parte. — *Microcos paniculata* sensu Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus Berlin. 9:774. 1926, non Linn., pro parte.

小乔木,高 2—5 米;嫩枝被星状茸毛。叶卵形或长卵形,长 9—16 厘米,宽 4.5—9 厘米,先端急短尖至锐尖,基部圆形或微心形,上面无毛,下面密被褐色星状柔毛,基出脉的两侧脉上行到达叶片中部;叶柄长约 1 厘米,被茸毛。顶生圆锥花序约长 4—7 厘米;花柄长 2—4 毫米;萼片长圆形,长 5—6 毫米,外面被茸毛;花瓣长为萼片的 1/2;腺体长 1—1.5 毫米;雄蕊与萼片几等长;子房无毛或基部有毛,花柱比雄蕊略长,无毛,先端尖。核果倒卵形。 花期夏季。

产于海南(新分布)。印度尼西亚、马来西亚、中南半岛有分布。

这个种的特征在于叶下面密被褐色茸毛,在果枝上仍保存不脱落。

7. 扁担杆属——*Grewia* Linn.

Linn. Sp. Pl. 1:964. 1753; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1:233. 1862.

乔木或灌木;嫩枝通常被星状毛。叶互生,具基出脉,有锯齿或有浅裂;叶柄短;托叶细小,早落。花两性或单性雌雄异株,通常 3 朵组成腋生的聚伞花序;苞片早落;花序柄及花柄通常被毛;萼片 5 片,分离,外面被毛,内面秃净,稀有毛;花瓣 5 片,比萼片短;腺体常为鳞片状,着生于花瓣基部,常有长毛;雌雄蕊柄短,秃净;雄蕊多数,离生;子房 2—4 室,每室有胚珠 2—8 颗,花柱单生,顶端扩大,柱头盾形,全缘或分裂。核果常有纵沟,收缩成 2—4 个分核,具假隔膜;胚乳丰富,子叶扁平。

属的模式种为: *M. occidentalis* Linn.

约 90 余种,分布于东半球热带。我国有 26 种,主产长江流域以南各地。

分种检索表

1. 花两性;子房及核果均球形,不分裂,具 1—2 颗分核。
2. 直立木本;叶阔卵状圆形至卵状长圆形,下面被茸毛,或有时秃净。
 3. 叶下面被灰色茸毛,基部斜圆形或斜截形…………… 1. 毛果扁担杆 *G. eriocarpa* Juss.
 3. 叶下面被黄褐色茸毛,或有时秃净,基部斜心形或正圆形。