

21. 叶边缘的锯齿整齐, 无大小之分。

22. 叶披针形或长圆状披针形, 长 4—14 厘米, 宽 2—4 厘米。

23. 叶下面被黄褐色或灰褐色茸毛或粗毛。

24. 叶下面被厚而软的茸毛。

25. 叶下面被灰褐色软茸毛; 叶柄长 3—8 毫米。

26. 叶革质; 叶柄长 3—5 毫米……………20. 崖县扁担杆 *G. chuniana* Burret

26. 叶纸质; 叶柄长 5—8 毫米……………21. 寡蕊扁担杆 *G. oligandra* Pierre

25. 叶下面被黄褐色粗茸毛; 叶柄长 2—3 毫米……………22. 粗毛扁担杆 *G. hirsuta* Vahl

24. 叶下面被稀疏黄褐色星状粗毛; 果宽 1—1.2 厘米……………

……………23. 短柄扁担杆 *G. brachypoda* C. Y. Wu

23. 叶下面被灰白色紧贴星状柔毛……………24. 钝叶扁担杆 *G. retusifolia* Pierre

22. 叶带形, 长 13—18 厘米, 宽 2—3 厘米, 革质……………25. 镰叶扁担杆 *G. falcata* C. Y. Wu

21. 叶边缘锯齿大小相间, 形如复齿, 叶革质, 被厚茸毛……………

……………26. 复齿扁担杆 *G. cuspidato-serrata* Burret

19. 叶阔长圆形, 基部阔楔形或单侧钝形; 叶柄长 7—9 毫米……………

……………27. 黄麻叶扁担杆 *G. henryi* Burret

1. 毛果扁担杆 (海南植物志) 图版 24: 1—5


Grewia eriocarpa Juss. in Ann. Mus. Paris 4:93. 1804; DC. Prodr. 1:512. 1824; Gagnep. in Lecomte. Fl. Gén. Indo-Chine 1:540. 1911; Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. 9:652, 1926. H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 541. 1963; 海南植物志 2: 60, 1965. — *G. boehmeriifolia* Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 18:332. 1928. — *G. lanisangensis* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 10:134. 1940.

灌木或小乔木, 高达 8 米; 嫩枝被灰褐色星状软茸毛。叶纸质, 斜卵形至卵状长圆形, 长 6—13 厘米, 宽 3—6 厘米, 先端渐尖或急尖, 基部偏斜, 斜圆形或斜截形, 上面散生星状毛, 干后变黑褐色, 下面被灰色星状软茸毛, 三出脉的两侧脉上升达叶长的 3/4, 中脉上半部有侧脉 3—4 对, 边缘有细锯齿; 叶柄长 5—10 毫米; 托叶线状披针形, 长 5—10 毫米。聚伞花序 1—3 枝腋生, 长 1.5—3 厘米, 花序柄长 3—8 毫米; 花柄长 3—5 毫米; 苞片披针形; 花两性; 萼片狭长圆形, 长 6—8 毫米, 内外两面均被毛; 花瓣长 3 毫米; 腺体短小; 雌雄蕊柄被毛; 雄蕊离生, 长短不一, 比萼片短; 子房被毛, 花柱有短柔毛, 柱头盾形, 4 浅裂或不分裂。核果近球形, 直径 6—8 毫米, 被星状毛, 有浅沟。

产于云南、贵州、广西、广东、台湾。中南半岛、印度、菲律宾、印度尼西亚有分布。模式标本采自印度尼西亚。

2. 朴叶扁担杆 (新拟)

Grewia celtidifolia Juss. in Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 4:93. 1804; Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. 9:654. 1926. — *G. asiatica* Linn. var. *celtidifolia* (Juss.) Gagnep. in Lecomte, Fl. Indo-Chine 1:537. 1911.



1—5.毛果扁担杆 *Grewia eriocarpa* Juss.: 1.果枝, 2.花, 3.果, 4.星状毛, 5.花瓣。6—11.扁担杆 *Grewia biloba* G. Don: 6.果枝, 7.花, 8.雄蕊, 9.花瓣, 10.果, 11.星状毛。12—15.无柄扁担杆 *Grewia sessiliflora* Gagnep.: 12.果枝, 13.花, 14.雌蕊, 15.星状毛。(邓晶发绘)