

5. 菱叶扁担杆(新拟)

Grewia rhombifolia Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. **18**:335. 1928; L. H. Li, Woody Fl. Taiwan 541. 1963.

灌木;嫩枝被锈褐色星状茸毛。叶菱形或卵形,稀为卵圆形,长2.5—5.5厘米,宽2—4.5厘米,先端略尖或钝,基部阔楔形或近圆形,三出脉的两侧脉上升过半,中脉有侧脉4—5对,边缘有不整齐的锯齿,两面初被稀疏星状柔毛,以后变秃净,仅在下面脉上有毛;叶柄长5—7毫米;托叶钻形,长5—7毫米。聚伞花序腋生,花序柄长5—8毫米;花柄长5—7毫米;苞片钻形,长4毫米;萼片长6毫米,宽1.5—2毫米,外面被星状茸毛,内面无毛;花瓣长圆形,长1.5毫米;腺体近圆形,周围有毛;雄蕊多数,与长丝毛间生;子房被毛,花柱无毛,柱头2—4裂。花期6月。

产于我国台湾。模式标本采自台湾。

这个种很接近扁担杆 *G. biloba* G. Don, 只是叶片菱形,长与宽几相等,后者的长度为宽度的两倍而不同。

6. 扁担杆(中国高等植物图鉴) 图版 24:5—9

Grewia biloba G. Don Gen. Syst. **1**:549. 1831; Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. **9**:708. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:612. 1933; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 539. 1963——*G. glabrescens* Benth. Fl. Hongk. **42**. 1861——*G. parviflora* Bunge var. *glabrescens* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:371. 1916——*G. esquirolii* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 419. 1915——*Celastrus euonymoidea* Levl. l. c.——*Grewia tenuifolia* Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. **13**:377. 1928.

6a. 扁担杆(原变种) 图版 23

var. *biloba*

灌木或小乔木,高1—4米,多分枝;嫩枝被粗毛。叶薄革质,椭圆形或倒卵状椭圆形,长4—9厘米,宽2.5—4厘米,先端锐尖,基部楔形或钝,两面有稀疏星状粗毛,基出脉3条,两侧脉上行过半,中脉有侧脉3—5对,边缘有细锯齿;叶柄长4—8毫米,被粗毛;托叶钻形,长3—4毫米。聚伞花序腋生,多花,花序柄长不到1厘米;花柄长3—6毫米;苞片钻形,长3—5毫米;萼片狭长圆形,长4—7毫米,外面被毛,内面无毛;花瓣长1—1.5毫米;雌雄蕊柄长0.5毫米,有毛;雄蕊长2毫米;子房有毛,花柱与萼片平齐,柱头扩大,盘状,有浅裂。核果红色,有2—4颗分核。花期5—7月。

产于江西、湖南、浙江、广东、台湾,安徽、四川等省。模式标本采自广东。

关于这个种及有关变种的处理,以往有不同的意见,我们认为 *G. Don* 发表这个种时所采用的模式标本是来自中国南部,因此把 *Benth* 的种作为异名。

6b. 小花扁担杆(变种)

var. *parviflora* (Bunge) Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:612. 1929.——*G. parviflora*