

无毛;花瓣长2—3毫米;雄蕊长4—5毫米;子房被长毛,花柱长5—6毫米,柱头盘状,2浅裂。核果双球形,宽1.2厘米,发亮。花期6—7月。

产于广西平乐及那坡、云南富宁至蒙自(模式产地)、思茅及临沧一带。生长于海拔700—1400米的灌丛及针叶-阔叶林里。

15. 苘麻叶扁担杆(海南植物志)

Grewia abutilifolia Vent ex Juss. in Ann. Mus. Paris 4: 92. 1804; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1:390. 1874; Gagnep. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 1:542. 1911; Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berl in. 9:66. 1926; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7:612. 1933; 海南植物志 2:61. 1965; 中国高等植物图鉴 2:797. 图 3324. 1972. —*G. kainantensis* Masumune in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 33:166. 1943.

灌木至小乔木,高1—5米;嫩枝被黄褐色星状粗毛。叶纸质,阔卵圆形或近圆形,长7—11厘米,宽5—9厘米,先端急短尖,基部圆形或微心形,上面有分散的星状粗毛,下面密被黄褐色而略粗糙的星状茸毛,基出脉3条,两条侧生基出脉上行过半,并各有第二次支脉7—9条,中脉亦有侧脉3—4对,边缘有细锯齿,先端常有浅裂;叶柄长1—2厘米,被星状粗茸毛。聚伞花序3—7枝簇生于叶腋,花序柄长3—6毫米;花柄长4—8毫米;苞片线形,早落;萼片狭长圆形,长6—8毫米,宽约2毫米,外面被毛,内面秃净;花瓣长2—3毫米;雌雄蕊柄无毛;雄蕊长4—5毫米;子房被长毛,花柱与萼片平齐,柱头2裂。核果被毛,有2—4颗分核。

产于云南、广西、广东及台湾。生长于荒野灌丛草地上。印度尼西亚、中南半岛及印度有分布。模式标本采自马来西亚。

16. 稔叶扁担杆(新拟)

Grewia urenifolia (Pierre) Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1:126. 1909, et in Fl. Gén. Indo-Chine 1:538. 1911; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:612. 1933. —*G. abutilifolia* var. *urenifolia* Pierre, Fl. For. Cochinch. Pl. 164. 1888.

灌木,高1—2米;嫩枝被星状粗毛。叶阔卵圆形,长6—8厘米,宽4—6.5厘米,基部心形,上面有粗糙星状毛,下面密被星状粗毛;叶柄长1—1.5厘米,被粗毛。聚伞花序1—2枝腋生,花序柄长约1厘米;花柄长4—6毫米;花蕾长6—7毫米;萼片长6毫米,外面有毛,内面无毛;花瓣短小;腺体基部有毛;子房有毛,花柱5裂。

产于海南、广西及云南。生长于次生灌丛中。中南半岛有分布。

本种与苘麻叶扁担杆 *G. abutilifolia* 很近似,只是花序1—2枝腋生,花序柄较花柄长,柱头5裂而区别。

17. 同色扁担杆(海南植物志) 图版 25:1—2

Grewia concolor Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14: 35. 1935; 海南植物志 2:61. 1965.