

蔓性灌木；嫩枝被锈褐色星状茸毛。叶长圆形，革质，长7—12厘米，宽2.5—4厘米，先端短尖或略钝，基部近圆形或微心形，稍偏斜，两面初时均被稀疏星状毛及长单毛，以后变秃净或仅在两面脉上残留有稀疏单毛，基出脉3条，两侧脉上行不过半，中脉有侧脉5—6对，边缘有细锯齿；叶柄长5—7毫米，多少有毛；托叶披针形，长5毫米，宽2毫米。聚伞花序1—2枝腋生，各有花2—3朵，花序柄长约1厘米；花柄长5—9毫米，均被褐毛；苞片钻形，长5毫米，外面有毛；花单性；萼片狭披针形，长7—8毫米，内面无毛；花瓣长2.5—3毫米；腺体倒卵形，周围有毛；雄蕊多数；子房被长毛，花柱无毛，柱头5裂。核果双球形或四球形。花期7—8月。

产于海南及福建。生长于森林里或开朗灌丛中。模式标本采自海南崖县风上村。

18. 长瓣扁担杆(新拟)

Grewia macropetala Burret in Fedde, Rep. Sp. Nov. 33:74. 1933.

灌木，高1—3米；嫩枝被褐色星状短粗毛。叶薄革质，长圆状披针形，长4—6.5厘米，宽1.5—2厘米，先端渐尖，基部狭而圆，两面初时有稀疏星状短粗毛，以后变秃净，遗下小瘤状突起，三出脉的两侧脉到达叶片中部，中脉有侧脉3—4对，边缘有不整齐细锯齿；叶柄长4—5毫米，被星状短毛。聚伞花序1—2枝腋生，每枝有花3朵，花序柄纤细，长5—14毫米；花柄长4—12毫米，均被星状短毛；苞片线形，长3—4毫米；萼片长6毫米，外面有毛，内面无毛；花瓣长4—5毫米；雌雄蕊柄短，无毛；雄蕊16—18枚，与花瓣等长或稍超出；子房有毛，花柱与雄蕊平齐，2—4裂。核果2—4浅裂，初时有毛，后变秃净。花期5—6月。

产于广西、广东。生长于次生林中。模式标本采自广西的近贵州边境处。

这个种和黄麻叶扁担杆 *G. henryi* Burret 有亲缘关系，惟叶片细小，常变秃净，花序及花均较短小可资区分。

19. 无柄扁担杆(海南植物志) 图版 24:12—15

Grewia sessiliflora Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1:167. 1910: in Fl. Gen. Indo-Chine 1:546. 1911; 海南植物志 2:60. 1965; 中国高等植物图鉴 2:798. 图 3325. 1972.

灌木；嫩枝被黄褐色软茸毛，三年生老枝仍有残留茸毛。叶纸质，三角状披针形，长6—10厘米，宽3—5厘米，先端狭窄而渐尖，基部偏斜圆形或微心形，上面有星状软茸毛，下面密被黄褐色软茸毛，三出脉的两边脉到达叶片中部，离边缘7—13毫米，中脉有侧脉3—4对，边缘有锯齿；叶柄长1—3毫米。聚伞花序1—2枝腋生，长4—5厘米，花序柄长3—4厘米，被茸毛；苞片线形，长7—8毫米，被茸毛；萼片披针形，长8—9毫米，宽1.5毫米，外面有茸毛，内面无毛；花瓣长4—5毫米；雄蕊比花瓣略长；子房被茸毛，花柱超出雄蕊。核果双球形，发亮，有稀疏星状毛。花期6—7月。

产于广东、广西南部。生长于低海拔的次生林中。越南北部有分布。模式标本采自

越南北部的凉山。

本种的主要识别特征是叶三角状披针形,被黄褐色软茸毛,花序长4—5厘米,是本属当中具有最长花序的种类。

20. 崖县扁担杆(海南植物志)

Grewia chuniana Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. 13:488. 1936; 海南植物志 2:60. 1965.

灌木;嫩枝密被锈褐色茸毛,老枝秃净,暗褐色。叶长圆状披针形,革质,长7—11厘米,宽3—4厘米,先端渐尖,基部圆形或不等侧微心形,上面有稀疏茸毛,下面密被灰褐色星状软茸毛,三出脉的两侧脉上升不过半,中脉有侧脉5—7对,边缘有细锯齿;叶柄长3—5毫米,密被茸毛;托叶钻形,长5—6毫米。聚伞花序腋生,有花3朵;花序柄长1—1.2厘米;花柄长5—7毫米,均被茸毛;苞片钻形,长5毫米;萼片长5—6毫米,外面密被茸毛,内面无毛;花瓣长2.5毫米,基部内侧有鳞状腺体,并围以长毛;雄蕊多数,比萼片短,略超出花瓣;子房被毛,花柱约与萼片平齐,柱头盾状,多裂。花期8—9月。

产于海南。生长于海边灌丛中。模式标本采自海南。

这个种近似粗毛扁担杆 *G. hirsuta* Vahl, 只是叶片被灰褐色星状茸毛,叶面干后不变黑,花序较长而不同。

21. 寡蕊扁担杆(新拟)

Grewia oligandra Pierre, Fl. For. Cochinch. 2:163. 1888; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1:545. 1911.

灌木;嫩枝被星状茸毛,老枝暗褐色。叶披针形或长圆状披针形,纸质,长9—10.5厘米,宽2—3.5厘米,先端锐尖,基部圆形,上面有稀疏星状短粗毛,干后变暗褐色,下面密被灰褐色软茸毛,三出脉的两侧脉到达叶片中部,中脉有侧脉4—5对,边缘有大小相间的细锯齿;叶柄长5—8毫米;托叶钻形,长4毫米,早落。聚伞花序有花3—5朵,花序柄长4—7毫米;花柄长3—4毫米,均被茸毛;苞片长3—4毫米;萼片长5—6毫米,外面有茸毛,内面无毛;花瓣长圆形,长2—3毫米;腺体鳞片状,周围有毛;雄蕊比萼片短;子房被毛,柱头多裂。核果双球形或四球形,直径1厘米,发亮。花期8月。


产于广东、广西。中南半岛有分布。模式标本采自越南。

这个种和复齿扁担杆 *G. cuspidato-serrata* Burret 近似, 只是据叶下面被灰褐色软茸毛,花序柄较长而区别。

22. 粗毛扁担杆(新拟)

Grewia hirsuta Vahl Symb. 1:34. 179; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1:391. 1874; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1:534. 1911. — *G. pilosa* Roxb. Fl. Ind. 2: 587. 1824, non Lam.

灌木或小乔木;嫩枝被灰褐色星状粗毛。叶革质,披针形,长6—14厘米,宽2—3.5



1—5.毛果扁担杆 *Grewia eriocarpa* Juss.: 1.果枝, 2.花, 3.果, 4.星状毛, 5.花瓣。6—11.扁担杆 *Grewia biloba* G. Don: 6.果枝, 7.花, 8.雄蕊, 9.花瓣, 10.果, 11.星状毛。12—15.无柄扁担杆 *Grewia sessiliflora* Gagnep.: 12.果枝, 13.花, 14.雌蕊, 15.星状毛。(邓晶发绘)