

越南北部的凉山。

本种的主要识别特征是叶三角状披针形,被黄褐色软茸毛,花序长4—5厘米,是本属当中具有最长花序的种类。

20. 崖县扁担杆(海南植物志)

Grewia chuniana Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin. 13:488. 1936; 海南植物志 2:60. 1965.

灌木;嫩枝密被锈褐色茸毛,老枝秃净,暗褐色。叶长圆状披针形,革质,长7—11厘米,宽3—4厘米,先端渐尖,基部圆形或不等侧微心形,上面有稀疏茸毛,下面密被灰褐色星状软茸毛,三出脉的两侧脉上升不过半,中脉有侧脉5—7对,边缘有细锯齿;叶柄长3—5毫米,密被茸毛;托叶钻形,长5—6毫米。聚伞花序腋生,有花3朵;花序柄长1—1.2厘米;花柄长5—7毫米,均被茸毛;苞片钻形,长5毫米;萼片长5—6毫米,外面密被茸毛,内面无毛;花瓣长2.5毫米,基部内侧有鳞状腺体,并围以长毛;雄蕊多数,比萼片短,略超出花瓣;子房被毛,花柱约与萼片平齐,柱头盾状,多裂。花期8—9月。

产于海南。生长于海边灌丛中。模式标本采自海南。

这个种近似粗毛扁担杆 *G. hirsuta* Vahl, 只是叶片被灰褐色星状茸毛,叶面干后不变黑,花序较长而不同。

21. 寡蕊扁担杆(新拟)

Grewia oligandra Pierre, Fl. For. Cochinch. 2:163. 1888; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1:545. 1911.

灌木;嫩枝被星状茸毛,老枝暗褐色。叶披针形或长圆状披针形,纸质,长9—10.5厘米,宽2—3.5厘米,先端锐尖,基部圆形,上面有稀疏星状短粗毛,干后变暗褐色,下面密被灰褐色软茸毛,三出脉的两侧脉到达叶片中部,中脉有侧脉4—5对,边缘有大小相间的细锯齿;叶柄长5—8毫米;托叶钻形,长4毫米,早落。聚伞花序有花3—5朵,花序柄长4—7毫米;花柄长3—4毫米,均被茸毛;苞片长3—4毫米;萼片长5—6毫米,外面有茸毛,内面无毛;花瓣长圆形,长2—3毫米;腺体鳞片状,周围有毛;雄蕊比萼片短;子房被毛,柱头多裂。核果双球形或四球形,直径1厘米,发亮。花期8月。

产于广东、广西。中南半岛有分布。模式标本采自越南。

这个种和复齿扁担杆 *G. cuspidato-serrata* Burret 近似, 只是据叶下面被灰褐色软茸毛,花序柄较长而区别。

22. 粗毛扁担杆(新拟)

Grewia hirsuta Vahl Symb. 1:34. 179; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1:391. 1874; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1:534. 1911. — *G. pilosa* Roxb. Fl. Ind. 2: 587. 1824, non Lam.

灌木或小乔木;嫩枝被灰褐色星状粗毛。叶革质,披针形,长6—14厘米,宽2—3.5