

厘米,先端渐尖,有时钝,基部狭而圆,有时微心形,上面干后黑褐色,有稀疏星状粗毛,下面被黄褐色星状茸毛,三出脉的两侧脉到达叶片中部,中脉有侧脉 4—5 对,边缘密生细锯齿;叶柄长 2—3 毫米,被茸毛。聚伞花序 1—5 枝腋生,每枝有花 3—4 朵,花序柄长 3—7 毫米;花柄长 3—5 毫米,均被茸毛;苞片披针形,长 3—4 毫米;萼片 5 片,狭披针形,长 6—7 毫米,宽 1.5 毫米,外面有茸毛,内面无毛;花瓣 5 片,狭卵形,长 3 毫米,宽 1.5 毫米;雄蕊长 4—5 毫米,花药有 5 条直沟;子房被长茸毛,4 室,花柱超出雄蕊,无毛,柱头盘状,4 裂。核果球形或双球形,有稀疏粗毛,有 2—4 颗分核。花期 6—7 月。

产于广西南部。中南半岛有分布。

23. 短柄扁担杆(新拟)

Grewia brachypoda C. Y. Wu in Journ. W. China Border Res. Soc. ser. 16: 162. 1946.

灌木,高 1 米;嫩枝密被灰黄色茸毛,稍粗糙。叶长圆状披针形或狭长圆形,长 4—9 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端急锐尖,基部圆形,上面有星状粗毛,变秃净后遗下小瘤状突,下面略被黄褐色星状粗毛,三出脉的两侧脉到达叶片中部,中脉有侧脉 3—4 对,边缘有细锯齿;叶柄长约 1 毫米,被茸毛。聚伞花序 1—2 枝腋生,每个花序有花 3 朵,花序柄长 1 厘米;花柄长 4—6 毫米,均被茸毛;萼片长 5—7 毫米,宽 2—2.5 毫米,外面被毛,内面无毛;花瓣长 2—3 毫米;雄蕊长 3—5 毫米;子房被长毛,花柱长 3—4 毫米。核果圆球形,2 裂,宽 1—1.2 厘米,发亮,有稀疏长毛。

产于云南禄劝至滇西南一带及四川金阳。模式标本采自禄劝。

这个种近似粗毛扁担杆 *G. hirsuta* Vahl, 惟叶片干后不变黑,基部不呈微心形,毛被转稀薄,核果亦较大而区别。

24. 钝叶扁担杆(新拟)

Grewia retusifolia Pierre, Fl. For. Cochinch. 2:168. 1888; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1:533. 1911, non Kurz in Journ. As. Soc. Bengal 2:294. 1872.

灌木或小乔木;嫩枝纤细,被紧贴黄色星状茸毛。叶长圆状披针形,长 6—8.5 厘米,宽 2.2—3.4 厘米,先端钝或略尖,基部圆形,上面初时有星状短粗毛,以后变秃净,下面被灰白色紧贴星状柔毛,三出脉的两侧脉到达叶片中部,离边缘 4—7 毫米,中脉有侧脉 3—4 对,边缘有不规则小齿突;叶柄长 3—5 毫米。聚伞花序 1—2 枝腋生,每枝有花 3—5 朵,花序柄长 1 厘米,纤细,被毛;花柄长 3 毫米;苞片线状披针形,长 3—5 毫米;萼片狭披针形,长 5—6 毫米,外面有星状茸毛,内面无毛;花瓣长 2.5 毫米;雄蕊比花瓣略长;子房有毛,花柱超出雄蕊,柱头 4 裂。核果四球形。

产于广西南宁。生长于次生林中。越南及印度尼西亚有分布。模式标本采自越南。

25. 镰叶扁担杆(新拟)