

Chine 1: 552. 1911; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 93. 1866; Hand-Mzt. Symb. Sin. 7: 613. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 801. 图 3331. 1972.

木质草本或亚灌木, 高 1 米; 嫩枝被黄褐色长茸毛。叶厚纸质, 卵形或长卵形, 长 3—7 厘米, 先端渐尖或锐尖, 基部圆形或微心形, 上面有稀疏星状茸毛, 下面密被黄褐色厚星状茸毛, 基出脉 3 条, 两侧脉上行超过叶片中部, 边缘有不整齐锯齿; 叶柄长 1—2 厘米。聚伞花序 1 至数枝腋生, 花序柄长 5—8 毫米; 花柄长 3—5 毫米; 苞片披针形, 长 1 毫米; 萼片狭披针形, 长 7 毫米, 先端有角, 被毛; 花瓣黄色, 与萼片等长; 雄蕊 10 枚; 子房被毛。蒴果有刺长 8—10 毫米; 刺被毛, 先端有勾。 花期夏季。

产于云南、四川、贵州、广西、广东。常生于干燥的低坡灌丛中。热带亚洲各地及非洲有分布。

3. 单毛刺蒴麻 小刺蒴麻(海南植物志)

Triumfetta annua Linn. Mant. 1: 73. 1767; DC. Prodr. 1: 507. 1824; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 396. 1874; Sprag. et Hutch. in Journ. Linn. Soc. Bot. 89. 1909; 海南植物志 2: 62. 1965. — *T. suffruticosa* sensu Merr. in Lingn. Sci. Journ. 15: 423. 1936, non Blume.

草本或亚灌木; 嫩枝被黄褐色茸毛。叶纸质, 卵形或卵状披针形, 长 5—11 厘米, 宽 3—7 厘米, 先端尾状渐尖, 基部圆形或微心形, 两面有稀疏单长毛, 基出脉 3—5 条, 侧脉向上行超过叶片中部, 边缘有锯齿; 叶柄长 1—5 厘米, 有疏长毛。聚伞花序腋生, 花序柄极短; 花柄长 3—6 毫米; 苞片长 2—3 毫米, 均被长毛; 萼片长 5 毫米, 先端有角; 花瓣比萼片稍短, 倒披针形; 雄蕊 10 枚; 子房被刺毛, 3—4 室, 花柱短, 柱头 2—3 浅裂。蒴果扁球形; 刺长 5—7 毫米, 无毛, 先端弯勾, 基部有毛。 花期秋季。

产于云南、四川、湖北、贵州、广西、广东、江西、浙江。生长于荒野及路旁。马来西亚、印度及非洲有分布。

本种的茎皮纤维可作绳索及织物。

4. 粗齿刺蒴麻(海南植物志)

Triumfetta grandidens Hance in Journ. Bot. 15: 329. 1877; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 1: 553. 1911; Merr. in Trans. Am. Philos. Soc. new ser. 24(2): 258. 1935; 海南植物志 2: 63. 1965. — *Urena procumbens* sensu Lour. Fl. Cochinch. 417. 1790, ed. Willd. 507. 1793, non Linn.

4a. 粗齿刺蒴麻(原变种)

var. *grandidens*

木质草本, 披散或匍匐, 多分枝; 嫩枝有简单柔毛。叶变异较大, 下部的菱形, 3—5 裂, 上部的长圆形, 长 1—2.5 厘米, 宽 7—15 毫米, 先端钝, 基部楔形, 两面无毛或下面脉上有毛, 三出脉不强直上行, 边缘有粗齿; 叶柄长 5—10 毫米, 被毛。聚伞花序腋生, 长