

1—4 粒;种子长圆形。

属的模式种为: *C. yunnanensis* Smith et Evans

本属 2 种,产云南、贵州及广西。

分 种 检 索 表

1. 叶椭圆形,基部圆;嫩枝及叶下面无毛……………1. 滇桐 *C. yunnanensis* Smith et Evans
 1. 叶长圆形,基部楔形;嫩枝及叶下面被毛……………2. 桂滇桐 *C. kwangsiensis* Hsue

1. 滇桐(中国高等植物图鉴) 图版 27: 1—4

Craigia yunnanensis Smith et Evans in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. **28**: 69. 1921; H. T. Chang et R. H. Miao in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatsen. **3**: 21. 1978——
Burretiodendron combretoides Chun et How in Acta Phytotax. Sin. **5**: 8. 1956——
B. yunnanense (Smith et Evans) Kosterm. in Reinwardtia **6**: 8. fig. 6. 1961.

落叶乔木,高 6—20 米;嫩枝无毛,顶芽有灰白色毛。叶纸质,椭圆形,长 10—20 厘米,宽 5—11 厘米,先端急短尖,基部圆形,上面干后暗绿色,不发亮,无毛,下面同色,秃净,基出脉 3 条,两侧脉离边缘 8—10 毫米,上行不过半,中脉有侧脉 5—7 对,边缘有小齿突;叶柄长 1.5—5 厘米。聚伞花序腋生,长约 3 厘米,有花 2—5 朵;花柄有节;萼片 5 片,长圆形,长约 1 厘米,外面被毛;花瓣缺;外轮雄蕊退化,10 枚,内轮能育雄蕊 20 枚,比萼片短;子房无毛,5 室,每室有胚珠 6 颗,花柱 5 条。具翅蒴果椭圆形,长 3.5 厘米,宽 2.5—3 厘米,翅薄,膜质,5 棱;种子长约 1 厘米。

产于云南南部、贵州南部及广西西南部。模式标本采自云南。


Kosterman 曾把这个种转移入柄翅果属 *Burretiodendron* 作为一个新组合种,其实本属具两性花,无花瓣,子房无柄,蒴果的翅有网纹,各具不同属的特征。

2. 桂滇桐(植物分类学报) 图版 28

Craigia kwangsiensis Hsue in Acta Phytotax. Sin. **13**: 107. 1975; H. T. Chang et R. H. Miao in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatsen. **3**: 21. 1978.

落叶乔木;顶芽有鳞苞,与嫩枝均被星状短柔毛。叶纸质,长圆形,长 7—9 厘米,宽 2.5—4 厘米,先端渐尖,基部楔形,上面干后暗绿色,不发亮,无毛,下面同色,有黄褐色短柔毛,基出脉 3 条,两侧脉贴近边缘,上行不过叶片长度的 1/3,中脉有侧脉 5—6 对,网脉明显,边缘有细锯齿;叶柄长 1.8—2.5 厘米。果序腋生,聚伞式排列,果序柄长 1—1.5 厘米;果柄长 1—1.2 厘米,有节,均被星状短柔毛;具翅蒴果椭圆形,长 2.5—3 厘米,宽 2—2.4 厘米,翅薄膜质,有横走脉纹,种子每室 4 颗;种子椭圆形,长约 8 毫米。果期 11 月。

产于广西。生长于低海拔的石灰岩上的常绿阔叶林中。模式标本采自广西田林。



1—4. 滇桐 *Craiga yunnaensis* Smith et Evans: 1. 果枝, 2. 具翅蒴果, 3. 翅果上星状毛, 4. 叶下面毛。 5—8. 长鞘蝇木 *Excentrodendron obeonicum* (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miao: 5. 叶片, 6. 果枝, 7. 果, 8. 种子。(谢庆建绘)