

pro parte.—*B. tonkinensis* kosterm. in *Reinwardtia* 5: 239. 1960.

常绿乔木;嫩枝及顶芽均无毛。叶革质,卵形,长14—18厘米,宽8—10厘米,先端渐尖,基部圆形,上面绿色,发亮,下面同色,脉腋有囊状腺体及毛丛,无毛,基出脉3条,两侧脉上行达叶片长度的1/2,且各有第二次分枝侧脉5—6条,离边缘1—1.2厘米,基部无明显的边脉,中脉有侧脉3—4对,全缘;叶柄长3—6厘米,圆柱形,无毛。圆锥花序或总状花序长4—5厘米,有花3—6朵;花柄有节,被星状柔毛;苞片早落;萼片长圆形,长约1厘米,外面有星状柔毛,内面无毛,基部无腺体或内侧数片每片有2个球形腺体;花瓣倒卵形,长5—6毫米,无柄;雄蕊18—35枚,长5—6毫米,花丝基部略相连,分为5组,各组雄蕊不等数,花药长3毫米;子房5室,每室有胚珠2颗,具中轴胎座,花柱5条,离生,极短。蒴果纺锤形,长3.5—4厘米;果柄有节。

产于广西。常见于石灰岩的常绿林里。越南北部有分布。模式标本采自广西隆安。

这个种和蚬木 *E. hsienmu* (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miao 的区别,在于叶片较大,基部无明显的边脉,花序较短,少花,花柄有节,花瓣较短小,无爪。

3. 菱叶蚬木(中山大学学报)

Excentrodendron rhombifolium H. T. Chang et R. H. Miao in *Acta Sci., Nat. Univ. Sunyatsen.* 3: 23. 1978.

常绿乔木,高16米;嫩枝及顶芽均无毛。叶革质,椭圆状菱形,长10—15厘米,宽6—9厘米,先端急短尖,基部阔楔形,上面绿色,发亮,脉腋有囊状腺体,下面黄褐色,脉腋有毛丛,其余无毛,基出脉3条,两侧脉上行过半,离边缘1.5—2厘米,各有第二次支脉5—6条,基部有明显的边脉,全缘;叶柄长4.5—7.5厘米。花未见。果序长10—11厘米,有蒴果1—2个;果柄有节;蒴果长4.5厘米,无子房柄,基部稍狭窄。

产于广西。生长于石灰岩的常绿林里。模式标本采自广西龙津县。

这个种和蚬木 *Excentrodendron hsienmu* (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miao 及节花蚬木 *Excentrodendron tonkinense* (A. Chev.) H. T. Chang et R. H. Miao 的区别,在于叶片椭圆状菱形,基部阔楔形,果序较长,蒴果只有1—2个。

4. 长蒴蚬木(植物分类学报) 图版 27: 5—8

Excentrodendron obconicum (Chun et How) H. T. Chang et R. H. Miao, l. c. 23. 1978.—*Burretiodendron obconicum* Chun et How in *Acta Phytotax. Sin.* 5: 11. 1956.

常绿乔木,高20米;嫩枝及顶芽均无毛。叶革质,长圆形,长11—15厘米,宽5—6厘米,先端渐尖,基部楔形,上面绿色,发亮,脉腋有囊状腺体,下面同色,脉腋有毛丛,基出脉3条,两侧上行达半,离边缘7—10毫米,各有第二次支脉4—5条,基部无明显的边脉,中脉有侧脉3—4对,全缘。叶柄长5—6厘米。花未见。果序长10—11厘米,有蒴果1—4个;果柄有节;蒴果长倒卵形,长5—5.5厘米,有5条薄翅,下半部变狭窄;无子房