

14. 萼片 5 裂;小苞片 4, 叶状;子房 10 室,花柱端具无柄的柱头 10; 种子肾形, 无毛, 具细点……

..... 16. 大萼葵属 *Cenocentrum* Gagnep.

### 1. 锦葵族——*Malveae* A. Gray

草本, 很少为灌木或乔木;雄蕊柱上花药着生至顶端, 柱头与心皮同数; 果分裂成分果, 与果轴脱离。

本族我国计有 8 属 38 种和 10 变种, 其中逸生至我国或引入栽培的计 6 种。

#### 1. 锦葵属——*Malva* Linn.

Linn., *Sp. Pl.* 2: 687, 1753.

一年生或多年生草本;叶互生, 有角或掌状分裂。花单生于叶腋间或簇生成束, 有花梗或无花梗;有小苞片(副萼) 3, 线形, 常离生;萼杯状, 5 裂;花瓣 5, 顶端常凹入, 白色或玫红色至紫红色;雄蕊柱的顶端有花药;子房有心皮 9—15, 每心皮有胚珠 1 个, 柱头与心皮同数。果由数个心皮组成, 成熟时各心皮彼此分离, 且与中轴脱离而成分果。

本属的模式种: 欧锦葵 *Malva sylvestris* Linn., 产欧洲至亚洲。

本属约 30 种, 分布亚洲、欧洲和北非洲。我国有 4 种, 产各地。供观赏或药用和采嫩叶供蔬食。

### 分种检索表

1. 花大型, 紫红色, 直径 3—5 厘米;小苞片长圆形, 先端圆形; 果片背面网状, 微被柔毛 ..... 1. 锦葵 *M. sinensis* Cavan.
1. 花小型, 白色至淡粉红色, 直径 5—15 毫米;小苞片线状披针形, 先端锐尖;果片背面无毛, 边缘被条纹。
  2. 一年生草本;叶缘特别皱曲;果扁圆形, 直径 8 毫米, 分果片 11 ..... 2. 冬葵 *M. crispa* Linn.
  2. 二年生或多年生草本;叶缘不皱曲;果扁圆形, 直径 5—7 毫米, 分果片 10—11 或 13—15。
    3. 植株较小, 匍生, 高 20 厘米;基生叶直径 2—5 厘米;花梗长 2—5 厘米, 花冠长为萼片的 2 倍, 花瓣的爪具髯毛 ..... 3. 圆叶锦葵 *M. rotundifolia* Linn.
    3. 植株高大, 直立, 高达 1 米;基生叶直径 6—10 厘米;花近于无梗, 花冠微微超过萼片, 花瓣的爪不具髯毛 ..... 4. 野葵 *M. verticillata* Linn.
      4. 花簇生, 几无柄至极短柄;叶裂片三角形 ..... 4a. 野葵 *M. verticillata* var. *verticillata*
      4. 花簇生, 花梗不等长, 其中有 1 花梗特长;叶裂片圆形 ..... 4b. 中华野葵 *M. verticillata* var. *chinensis* (Miller) S. Y. Hu

1. 锦葵(尔雅注、群芳谱) 荆葵(陆玕诗疏), 钱葵(草花谱), 小钱花(江苏), 金钱紫花葵(图考引研经堂葵考), 小白淑气花(滇南本草), 淑(俗)气花(云南), 棋盘花(四川) 图版 1: 1—2

*Malva sinensis* Cavan. *Diss.* 2: 77, t. 25, f. 4, 1786; S. Y. Hu *Fl. China Family* 153: 4, pl. 1—2—6, 15—7, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 183,