

Peking Soc. Nat. Hist. 2 (3): 133, 1928; Pèi in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. ser 9, 182, 1934.

叶浅裂，裂片圆形；花簇生于叶腋，花梗不等长，其中有1花梗特长，长达4厘米，因此与原变种不同。

产河北、山东、陕西、山西、甘肃、新疆、四川、贵州、云南、湖南、湖北、广东、江西、安徽、江苏和浙江等省区。分布至朝鲜。

本变种与小花锦葵 *M. parviflora* Linn. 近似，但本变种的雄蕊柱具刺毛，分果片平滑，而小花锦葵的雄蕊柱无毛和分果片有明显的网纹而不同。

## 2. 花葵属——*Lavatera* Linn.

Linn., Sp. Pl. 690, 1753.

草本或灌木。叶有棱角或分裂，有时如槭叶状。花各色，稀黄色，成顶生总状花序或1—4朵生于叶腋间；总苞的小苞片3—6枚；萼钟形，5裂；花冠漏斗形，花瓣5，顶端具缺刻或截形，有爪；雄蕊柱的顶部分裂为无数的花丝；心皮7—25，环绕中轴合生，中轴顶部伞状而突出心皮外，每室具胚珠1颗，花柱基部扩大，柱头丝状。果盘状，种子肾形，平滑无毛。

本属的模式种：三月花葵 *Lavatera trimestris* Linn. (产欧洲)。

本属约25种，分布于欧、亚、美及大洋洲等。我国有3种(包括栽培种)。

本属的花大色艳，常栽培供园林观赏用。

### 分种检索表

1. 一年生或二年生草本；心皮7—18。
  2. 一年生草本；叶肾形，上部的卵形，常3—5裂；花单生；小苞片具齿；心皮10—18 ..... 1. 三月花葵 *L. trimestris* Linn.
  2. 二年生木质状草本；叶肾形，5—9裂；花簇生或总状花序；小苞片全缘；心皮7 ..... 2. 花葵 *L. arborea* Linn.
1. 多年生草本；心皮20—25；叶圆形，3—5裂；小苞片全缘 ..... 3. 新疆花葵 *L. cashemiriana* Cambess.

#### 1. 三月花葵 裂叶花葵

*Lavatera trimestris* Linn. Sp. Pl. 692, 1753; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 59, 1931; 贾祖璋, 中国植物图鉴 438, 图 745, 1937; 崔友文, 华北经济植物志要 312, 1953; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 8, Pl. 2, 1955.

一年生草本，高1—2米，少分枝，被短柔毛。叶肾形，上部的卵形，常3—5裂，长2—5厘米，宽2.5—7厘米，边缘具锯齿或牙齿，上面被疏柔毛，下面被星状疏柔毛；叶柄长3—7厘米，被长柔毛；托叶卵形，长4—5毫米，先端渐尖头，被长柔毛。花紫色，单生于叶腋间，花梗长1.5—4厘米，被粗伏毛状疏柔毛；小苞片3枚，正三角形，具齿，长8毫米，宽