

*Abutilon sinense* var. *typica* Hochr. in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève 21: 447, 1920.

3a. 华苘麻 (原变种) 图版 8: 1

*Abutilon sinense* Oliv. var. *sinense*

灌木, 高约 3.5 米。叶近圆卵形, 长 7—13 厘米, 宽 4—13 厘米, 先端尾状渐尖, 基部心形, 边缘具粗牙齿, 上面被星状长硬毛, 下面被星状细绒毛和长毛; 叶柄长 8—20 厘米, 被丝状长毛。花单生于叶腋, 花梗长 3—5 厘米, 密被细绒毛和长毛; 萼片披针形, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 5—8 毫米, 密被星状细绒毛, 基部合生; 花大, 钟状, 黄色, 内面基部紫红色, 花瓣倒卵形, 长 3.5—5 厘米; 雄蕊柱长 2.5—3 厘米, 无毛, 顶端具多数花丝; 花柱分枝 8—10, 柱头头状。蒴果长 2—3 厘米, 直径 1.5—2.2 厘米, 分果片 8—10, 顶端尖, 被星状毛, 内具 7—9 个种子; 种子肾形, 疏被短刚毛。花期 1—5 月。

产湖北、四川、贵州、云南和广西等省区。生于海拔 300—2000 米的山坡疏林或竹林内。

3b. 无齿华苘麻 (变种)

*Abutilon sinense* Oliv. var. *edentatum* Feng 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 202, 1979.

叶近圆形, 先端具长尾状渐尖头, 边缘近全缘或微具圆锯齿而与原变种可区别。

产云南西部泸水县。生于海拔 1200 米的山坡灌丛中。

4. 滇西苘麻 (云南植物志)

*Abutilon gebauerianum* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 607, 1933; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 30, pl. 17-3, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 202, 1979. — *Abutilon sinense* var. *yunnanense* Hochr. in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève 21: 447, 1920.

灌木, 高达 3 米, 小枝被灰色星状绒毛。叶卵心形, 长 4—8 厘米, 宽 4—8 厘米, 先端长尾状渐尖头, 基部心形, 边缘具不整齐圆齿, 两面均密被毡毛; 托叶钻形, 长约 5 毫米, 早落。花单生于叶腋, 花梗长 1—2 厘米, 密被毡毛, 顶端具节; 花萼杯状, 长 2—2.5 厘米, 密被毡毛, 裂片 5, 披针形; 花大, 钟形, 桔黄色, 花瓣楔状倒卵形, 长 4—6 厘米; 雄蕊柱长约 5 厘米, 无毛; 花柱分枝 8—10, 柱头头状。果长约 2 厘米, 分果片 8—10, 顶端尖, 被毡毛; 种子肾形, 直径约 2 毫米, 疏被刚毛。花期 1—2 月。

产云南西南部的怒江河谷。生于海拔 700—2500 米的干热河谷灌丛中。

5. 金铃花 (云南植物志) 灯笼花 (福州) 图版 8: 2—3

*Abutilon striatum* Dickson. in Bot. Reg. Misc. 39, 1839; Bailey Man. Cult. Pl. 660, 1949; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 204, 1979. — *Sida picta* Gill. ex Hook. Bot. Misc. 3: 154, 1833; Curtis's Bot. Magaz. 67: f. 3840, 1841.