

常绿灌木，高达1米。叶掌状3—5深裂，直径5—8厘米，裂片卵状渐尖形，先端长渐尖，边缘具锯齿或粗齿，两面均无毛或仅下面疏被星状柔毛；叶柄长3—5厘米，无毛；托叶钻形，长约8毫米，常早落。花单生于叶腋，花梗下垂，长7—10厘米，无毛；花萼钟形，长约2厘米，裂片5，卵状披针形，深裂达萼长的3/4，密被褐色星状短柔毛；花钟形，桔黄色，具紫色条纹，长3—5厘米，直径约3厘米，花瓣5，倒卵形，外面疏被柔毛；雄蕊柱长约3.5厘米，花药褐黄色，多数，集生于柱端；子房钝头，被毛，花柱分枝10，紫色，柱头头状，突出于雄蕊柱顶端。果未见。花期5—10月。

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。我国福建、浙江、江苏、湖北、北京、辽宁等地各大城市栽培，供园林观赏用。

6. 圆锥苘麻 (云南植物志) 图版 8: 4—6

Abutilon paniculatum Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 606, 1933; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 34, pl. 17—8, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 205, 图 51, 6—7. 1979.

落叶灌木，高达2米，全株被星状绒毛，小枝纤细，圆柱形。叶卵心形，长4—9厘米，宽4—7厘米，先端长尾状，基部心形，边缘具不规则细圆齿，两面均密被星状绒毛；叶柄长3—5厘米，被绒毛；托叶线形长1—2厘米。塔状圆锥花序顶生，被星状绒毛；小花梗长2—3厘米，近端具节；花萼碟状，裂片5，卵形，长7—10毫米；花黄色至黄红色，直径1.5—2厘米，花瓣倒卵形，长约15—17毫米，无毛；雄蕊柱被星状硬毛。果近圆球形，分果片10，卵形，顶端圆，长约4毫米。花期6—8月。

产我国四川西南部木里县和云南西北部澜沧江岸。生于海拔2300—3000米的山坡灌丛或路边。

7. 恶味苘麻 (云南植物志)

Abutilon hirtum (Lamk.) Sweet Hort. Brit. ed. 1: 53, 1826; G. Don Gén. Syst. 1: 503, 1831; Wight & Arn. in DC. Prodr. 56, 1834; Merr. in Philip. J. Sc. 5: Bot. 197, 1910; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 204, 图 52, 1979.——*Sida hirta* Lamk. Encycl. 1: 7, 1783; Cavan. Diss. 1: 33, t. 7, f. 5, 1785; op. cit. 5: 276, t. 129, f. 1, 1788; DC. Prod. 1: 470, 1824.——*Abutilon graveolens* var. *hirtum* (Lamk.) Mast. in Fl. Brit. Ind. 1: 327, 1875; Baker f. in J. Bot. 31: 213, 1893.——*Abutilon indicum* var. *hirtum* (Lamk.) Griseb. in Fl. Brit. W. Ind. Is. 78, 1859.——*Sida graveolens* Roxb. [Hort. Beng. 50, 1814, nom. nud.] ex Hornem. Hort. Hafn., Suppl. 77, 1819; DC. Prod. 1: 473, 1824; Wall. Cat. n. 1856, 1858G, 1828; Roxb. Fl. Ind. ed. Carey 3: 179, 1832.——*Abutilon graveolens* (Roxb. ex Hornem.) Wight & Arn. ex Wight in Cat. 13, 1833; Wight & Arn. in DC., Prod. 56, 1834; Masters in Fl. Brit. Ind. 1: 327, 1875; Gagnep.



1. 华苘麻 *Abutilon sinense* Oliv.: 花枝。2—3. 金铃花 *Abutilon striatum* Dickson: 2. 叶, 3. 花。
4—6. 圆锥苘麻 *Abutilon paniculatum* Hand.-Mazz.: 4. 花枝, 5. 叶片毛被, 6. 茎上毛被。(曾孝廉绘)