

栽培于广东广州和福建厦门等地。原产于古巴至墨西哥。

极美丽的庭园观赏植物，常作为绿篱植物栽培。

3. 木槿族——*Hibisceae* Endl.

草本、灌木或乔木。雄蕊柱仅外面着生花药，顶端平截或具5齿，很少着生花药；花柱分枝与心皮同数。果为室背开裂的蒴果。

本族我国有6属28种15变种和变型。

11. 秋葵属——*Abelmoschus* Medicus

Medicus, Malv. 45, 1787.

一年生、二年生或多年生草本。叶全缘或掌状分裂。花单生于叶腋；小苞片5—15，线形，很少为披针形；花萼佛焰苞状，一侧开裂，先端具5齿，早落；花黄色或红色，漏斗形，花瓣5；雄蕊柱较花冠为短，基部具花药，子房5室，每室具胚珠多颗，花柱5裂。蒴果长尖，室背开裂，密被长硬毛；种子肾形或球形，多数，无毛。

本属的模式种：黄葵 *A. moschatus* Medicus

本属约15种，分布于东半球热带和亚热带地。我国有6种和1变种（包括栽培种），产于东南至西南各省区。

本属植物的花大而美丽，可供园林观赏用；有些种类入药用或供食用。

本属与木槿属极相似，主要不同处在于前者萼佛焰苞状，一侧开裂，在果时环状脱落，而后者萼宿存，易于区别。

分 种 检 索 表

1. 小苞片4—5，卵状披针形，宽达4—5毫米；花黄色…………… 1. 黄蜀葵 *A. manihot* (Linn.) Medicus
2. 植株疏被长硬毛…………… 1a. 黄蜀葵 *A. manihot* var. *manihot*
2. 植株密被黄色长刚毛…………… 1b. 刚毛黄蜀葵 *A. manihot* var. *pungens* (Roxb.) Hochr.
1. 小苞片6—20，线形，宽1—3毫米；花红色或黄色。
 3. 小苞片10—20；叶心形或掌状分裂。
 4. 小苞片15—20，宽1—2毫米；蒴果近圆球形，长3—4厘米…………… 2. 长毛黄葵 *A. erinitus* Wall.
 4. 小苞片12，宽2—3毫米；蒴果卵状椭圆形，长4.5—5.5厘米…………… 3. 木里秋葵 *A. muliensis* Feng
 3. 小苞片6—12；叶卵状戟形，箭形至掌状3—7裂。
 5. 花梗短，长1—2厘米；蒴果筒状尖塔形，长10—25厘米…………… 4. 咖啡黄葵 *A. esculentus* (Linn.) Moench
 5. 花梗较长，长2—7厘米；蒴果极短，近球形或椭圆形，长2—6厘米。
 6. 一年生或二年生草本，高1—2米；地下部具直根；小苞片在果时紧贴；花黄色，花瓣基部暗紫色；蒴果长5—6厘米…………… 5. 黄葵 *A. moschatus* Medicus
 6. 多年生草本，高0.4—1米；地下部具块茎状根；小苞片在果时开展或反曲；花黄色或红色；蒴果长约3厘米…………… 6. 箭叶秋葵 *A. sagittifolius* (Kurz) Merr.