

状披针形,被绒毛,中部以下连合成杯状;萼长1.5—2.5厘米,基部1/3—1/4处合生,萼裂5,披针形,被绒毛;花冠钟形,直径6—7厘米,花瓣黄色,内面基部暗紫色,倒卵形,长约4.5厘米,外面密被黄色星状柔毛;雄蕊柱长约3厘米,平滑无毛;花柱枝5,被细腺毛。蒴果卵圆形,长约2厘米,被绒毛,果片5,木质;种子光滑,肾形。花期6—8月。

产台湾、广东、福建等省。分布于越南、柬埔寨、老挝、缅甸、印度、印度尼西亚、马来西亚及菲律宾等热带国家。树皮纤维供制绳索,嫩枝叶供蔬食;木材坚硬致密,耐朽力强,适于建筑、造船及家具等用。在广州及广东沿海地区小城镇也有栽培,多作行道树。

3. 高红槿

Hibiscus elatus Sw. Fl. Ind. Occ. 2: 1218; DC. Prodr. 1: 454, 1824.——*Paritium elatum* Don Gard. Dict. 1: 485, 1831; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 87: tab. 5245, 1861.

常绿乔木,高5米,幼枝被白霜,平滑无毛。叶近圆心脏形,长10—16厘米,宽14—18厘米,先端短渐尖头,基部心形,全缘至有短齿,上面疏被星状柔毛,渐变无毛,下面被灰色星状绒毛;叶柄长4—9厘米,被白霜和疏柔毛;托叶长圆形,被毛,早落。花单生于叶腋或顶生,有托叶状苞片2;小苞片10—12,披针形,长约2.5厘米,在4/5处合生成筒状,密被星状细绒毛;花萼5,长3.5—4厘米,两面均密被细绒毛,常早落;花大,钟状,红色,直径约10厘米,花瓣5,倒卵状匙形或长圆状匙形,长9—10厘米,两面均被星状柔毛。果未见。

福建厦门大学于1930年引入栽培。原产西印度群岛。

本种花大,红色,萼片早落,与黄槿极易区别。

4. 樟叶槿(海南植物志) 图版16: 4

Hibiscus grewiaefolius Hassk. Cat. Hort. Bog. 197, 1844; Miq. Fl. Ind. Bat. 1 (2): 155, 1858; Craib Fl. Siam. En. 1: 157, 1931; J. van Borssum Waalkes in Blumea 14 (1): 54, 1966.——*Bombycidendron grewiaefolium* (Hassk.) Zoll. Nat. & Geneesk. Arch. 2: 140, 1845.——*Hibiscus bantamensis* Miq. Pl. Jungh. 282, 1854.——*Hibiscus praeclarus* Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indochine 1: 427, t. 20b, 1910; in Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 375, 1945.——*Hibiscus cinnamomifolius* Chun & Tsiang in Sunyatsenia 4: 18, t. 7, 1939; Merr. & Chun in ibidem 5: 127, 1940; Masam. Fl. Kain. 197, 1943; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 45, t. 20, f. 4, 1955; 陈焕镛, 海南植物志 2: 99, 1965.

常绿小乔木,高达7米;小枝圆柱形,淡灰白色,平滑无毛或具极细毛。叶纸质至近革质,卵状长圆形至椭圆状长圆形,长8—15厘米,宽6—7厘米,先端短渐尖,基部钝至阔楔形,全缘,两面均平滑无毛,上面暗绿色,下面苍绿色;基生脉3(—5)条,在下面隆起;叶柄长2—4.5厘米,疏被短柔毛;托叶小,早落。花未见。果单生于上部叶腋间,果梗长3—