

外面密被黄色星状长绒毛,内面疏被长柔毛,基部具髯毛;雄蕊柱长2—2.5厘米,不外露,花药红黄色;花柱枝5,具长丝状毛。蒴果卵圆形,长约2.3厘米;种子肾形,被白色棉毛,毛长约5毫米。花期10—11月。

产云南西北部丽江县和四川西南部盐边县。生于海拔高1300—1400米的干热河谷丛薄中。

6b. 光柱旱地木槿(云南植物志)(变种)

*Hibiscus aridicola* var. *glabratus* Feng, 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 225, 1979.

本变种的叶薄,呈坚纸质;花柱枝平滑无毛,与原变种易于区别。

产于云南西北部宁蒗县的金沙江沿岸和四川西南部木里县。生于海拔1600—2000米的山坡灌丛中。

7. 吊灯扶桑(广州植物志) 灯笼花(海南), 假西藏红花(广州) 图版 17: 6

*Hibiscus schizopetalus* (Masters) Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. 106: t. 6524, 1880; Hochr. in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève 4: 131, 1900; Gagnep. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 1: 432, 1910; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Aca. Peiping 1: 59, 1931; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 46. pl. 20—3, 1955; 侯宽昭, 广州植物志 251, 1956; 陈焕镛, 海南植物志 2: 98, 1965; 云南植物研究所, 云南植物志 2: 225, 1979. — *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *schizopetalus* Masters in Gard. Chron. n. s. 12: 272, f. 45, 1879.

常绿直立灌木,高达3米;小枝细瘦,常下垂,平滑无毛。叶椭圆形或长圆形,长4—7厘米,宽1.5—4厘米,先端短尖或短渐尖,基部钝或宽楔形,边缘具齿缺,两面均无毛;叶柄长1—2厘米,上面被星状柔毛;托叶钻形,长约2毫米,常早落。花单生于枝端叶腋间,花梗细瘦,下垂,长8—14厘米,平滑无毛或具纤毛,中部具节;小苞片5,极小,披针形,长1—2毫米,被纤毛;花萼管状,长约1.5厘米,疏被细毛,具5浅齿裂,常一边开裂;花瓣5,红色,长约5厘米,深细裂作流苏状,向上反曲;雄蕊柱长而突出,下垂,长9—10厘米,无毛;花柱枝5,无毛。蒴果长圆柱形,长约4厘米,直径约1厘米。花期全年。

产台湾、福建、广东、广西和云南南部各热地,均系栽培。原产东非热带。为热带各国常见的园林观赏植物;耐修剪,也是常见的绿篱植物。

8. 朱槿(南方草木状) 扶桑(本草纲目), 佛桑(南越笔记), 大红花(汉英韵府), 桑槿(酉阳杂俎), 状元红(云南)

*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. Sp. Pl. 694, 1753; DC. Prodr. 1: 448, 1824, descr.; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 344, 1874; Lour. Fl. Cochinch. 419, 1790; Curtis's Bot. Mag. 5: t. 158, 1792; Lindl. in Bot. Reg. 21: t. 1826, 1836; Forbes & Hemsl. in Jour. Linn. Soc. Bot. 23: 87, 1886 (Ind. Fl. Sin. 1);



1. 滇南芙蓉 *Hibiscus austro-yunnanensis* Wu & Feng: 果枝。2—3. 旱地木槿 *Hibiscus aridicola* var. *aridicola*: 2. 叶, 3. 果。4—5. 朱槿 *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *rosa-sinensis*: 4. 叶, 5. 花。6. 吊灯扶桑 *Hibiscus schizopetalus* (Masters) Hook. f.: 花。(李锡畴绘)