

Gagnep. in *Lect. Fl. Gén. Indo-Chine* 1: 429, 1910; Dunn & Tutch. in *Fl. Kwangt. Hongk.* 7: 609, 1933; 陈嵘, *中国树木分类学* 765, 图 652, 1937; 贾祖璋, *中国植物图鉴* 436, 图 741, 1937; Merr. in *Trans. Am. Philip. Soc.* n. s. 24: 260, 1935; 崔友文, *华北经济植物志要* 314, 1953; S. Y. Hu *Fl. China Family* 153: 47, pl. 20—6, 1955; 侯宽昭, *广州植物志* 252, 1956; 陈焕镛, *海南植物志* 2: 98, 1965; 昆明植物研究所, *云南植物志* 2: 225, 1979.——*Hibiscus javanicus* Miller Gard. Dict. ed. 8, n. 7, 1768, ex descr.——*Hibiscus festivalis* Salisb. Prodr. 383, 1796.——*Hibiscus rosiflorus* Stokes in *Bot. Mat. Med.* 3: 543, 1812.——*Hibiscus fragilis* Dc. Prodr. 1: 446, 1824, descr.——*Hibiscus rosiflorus* var. *simplex* Stokes l. c.——*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *genuinus* Hochr. l. c. 134. 1900.

8a. 朱槿(原变种) 图版 17: 4—5

*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *rosa-sinensis*

常绿灌木, 高约 1—3 米; 小枝圆柱形, 疏被星状柔毛。叶阔卵形或狭卵形, 长 4—9 厘米, 宽 2—5 厘米, 先端渐尖, 基部圆形或楔形, 边缘具粗齿或缺刻, 两面除背面沿脉上有少许疏毛外均无毛; 叶柄长 5—20 毫米, 上面被长柔毛; 托叶线形, 长 5—12 毫米, 被毛。花单生于上部叶腋间, 常下垂, 花梗长 3—7 厘米, 疏被星状柔毛或近平滑无毛, 近端有节; 小苞片 6—7, 线形, 长 8—15 毫米, 疏被星状柔毛, 基部合生; 萼钟形, 长约 2 厘米, 被星状柔毛, 裂片 5, 卵形至披针形; 花冠漏斗形, 直径 6—10 厘米, 玫瑰红色或淡红、淡黄等色, 花瓣倒卵形, 先端圆, 外面疏被柔毛; 雄蕊柱长 4—8 厘米, 平滑无毛; 花柱枝 5。蒴果卵形, 长约 2.5 厘米, 平滑无毛, 有喙。花期全年。

广东、云南、台湾、福建、广西、四川等省区栽培。花大色艳, 四季常开, 主供园林观赏用。

8b. 重瓣朱槿(变种) 朱槿牡丹(北京), 月月开(四川), 酸醋花(海南)

*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *rubro-plenus* Sweet Hort. Brit. 51, 1826; S. Y. Hu *Fl. China Family* 153: 48, pl. 21—5, 1955.——*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *carnea-plenus* Sweet l. c.——*Hibiscus rosa-sinensis* Linn. var. *floreplena* Seem *Fl. Vit.* 17, 1873.

本变种与原变种主要不同处在于花重瓣, 红色、淡红、橙黄等色。

栽培于广东、广西、云南、四川、北京等地, 供园林观赏用。

9. 庐山芙蓉(经济植物手册)

*Hibiscus paramutabilis* Bailey in *Gentes Herb.* 1: 109, f. 50, 1922; Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 609, 1933; S. Y. Hu *Fl. China Family* 153: 48, pl. 20—8, 1955.——*Hibiscus saltuarius* Hand.-Mazz. in *Sitzgsanz. Akad. Wiss. Wien Math.-Naturw. Kl.* 62: 251, 1925.