

## 10a. 美丽芙蓉(原变种)

*Hibiscus indicus* var. *indicis*

落叶灌木，高达3米，全株密被密闭的星状短柔毛。叶心形，长8—12厘米，宽10—15厘米，下部生的叶通常7裂，上部生的叶通常3—5裂，裂片宽三角形，具不整齐齿，两面均密被星状短柔毛；叶柄圆柱形，长6—11厘米，密被星状柔毛；托叶披针形，长约5毫米，早落。花单生于枝端叶腋间，花梗长约6—15厘米，端有节，密被星状绒毛；小苞片4或5，卵形，长约2厘米，宽8—12毫米，基部合生，密被星状绒毛；萼杯状，长约2.5厘米，近基部1/3处合生，裂片5，卵状渐尖形，密被星状绒毛；花粉红色至白色，直径约10厘米，花瓣倒卵形，长约6.5厘米，基部具髯毛，外面被星状长毛；雄蕊柱长3.5—4厘米；花柱枝疏被长毛。蒴果近圆球形，被硬毛，直径约3厘米，果爿5—6；种子肾形，长约3毫米，密被锈色柔毛。花期7—12月。

产云南、四川、广西、广东等省区。生于山谷灌丛中，海拔700—2000米的地带。分布于印度、越南、印度尼西亚（栽培）等东南亚地区。茎皮纤维可供绳索料；花大而美丽，栽培供园林观赏用。

## 10b. 全叶美丽芙蓉(变种)

*Hibiscus indicus* (Burm. f.) Hochr. var. *integrilobus* (S. Y. Hu) Feng, comb. nov. — *Hibiscus venustus* Bl. var. *integrilobus* S. Y. Hu Fl. China Family 153: 50, 1955.

本变种的叶裂片钝，全缘；花较小，花瓣长约3.5厘米，与原变种不同。

产我国台湾省恒春。

本变种的标本未见到，暂根据胡秀英的意见，留待以后考证。

## 11. 台湾芙蓉

*Hibiscus taiwanensis* S. Y. Hu Fl. China Family 153: 48, pl. 21—3, 1955.

落叶灌木，高3—8米，全体密被刚毛状糙毛，毛不为星状。叶近圆形，3—5裂，裂片三角形，叶柄长14—17厘米。花单生于枝端叶腋间，花梗长11—13厘米；小苞片8，线形，长8—12毫米，宽1.5—2毫米，被长柔毛状糙毛，毛长而不为星状；萼钟状，5裂，裂片三角形，长约10毫米，宽约8毫米，急尖头，被星状短绒毛；花冠近钟形，直径6—9厘米，花瓣近圆形，直径4—5厘米，被长柔毛，基部合生，具髯毛。

产我国台湾省阿里山。

本种标本未见到。据胡秀英称：与木芙蓉近似，不同处在于小枝、叶、叶柄及花梗被长刚毛状糙毛，而后者则密被星状绒毛而不同。

## 12. 木芙蓉(本草纲目) 芙蓉花(江苏、湖南、四川、陕西)，酒醉芙蓉(广东、福建)

*Hibiscus mutabilis* Linn. Sp. Pl. 694, 1753; Cavan. Diss 3: 165, t. 62,