

解毒之功效。

12b. 重瓣木芙蓉(变型)

Hibiscus mutabilis Linn. f. *Plenus* (Andrews) S. Y. Hu Fl. China Family 153: 51, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 229, 1979. — *Hibiscus mutabilis* Linn. var. *flore-pleno* Andrews in Bot. Repos. 4: t. 228, 1802.

本变型不同与原变型在于花系重瓣。

栽培于福建、广东、湖南、湖北、云南、江西和浙江等省。主供园林观赏用。

13. 贵州芙蓉 湖榕树(广西)

Hibiscus labordei Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 12: 184, 1913; Rehd. in Jour. Arnold Arb. 15: 94, 1934; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 55, pl. 15—9, 1955.

落叶灌木, 高3—6米, 小枝被星状细绵毛。叶掌状3裂, 长8—12厘米, 宽7—11厘米, 裂片三角形, 中裂片较长, 渐尖头, 侧裂片短, 钝头或短渐尖, 边缘具钝圆锯齿, 基部圆形、截形至微心形, 两面均疏被星状硬毛; 主脉5条; 叶柄长3—11厘米, 密被星状绵毛; 托叶线形, 长5—6毫米, 早落。花单生于枝端叶腋间, 花梗长1—3厘米, 密被星状绵毛; 小苞片5—6, 线状披针形, 长16—25毫米, 宽3—5毫米, 密被星状毛和刚毛; 萼钟形, 长约2.2厘米。裂片5, 卵形, 密被金黄色星状绒毛; 花冠钟形, 白色至淡粉红色, 内面基部紫色, 直径6—8厘米, 花瓣倒卵形, 长约6厘米, 外面被星状长硬毛, 基部具髯毛; 雄蕊柱长约3厘米; 花柱枝被长毛。 花期6月。

产贵州南部和广西北部全州县和罗城。生于海拔1300米的山谷湿润地。

本种与庐山芙蓉和美丽芙蓉极近似, 但叶为掌状3裂; 小苞片线状披针形, 花梗较短和花较小而不同。

14. 木槿(日华本草) 木棉、荆条(江苏), 朝开暮落花(本草纲目), 喇叭花(福建)

Hibiscus syriacus Linn. Sp. Pl. 695, 1753; Cavan. Diss. 3: 169, t. 69, f. 1, 1787; Lour. Fl. Cochinch. 420, 1790; ed. Willd. 511, 1793; Masters in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1: 344, 1874; Forbes & Hemsl. in Jour. Linn. Soc. Bot. 23: 88, 1886 (Ind. Fl. Sin. 1); Gureke & Diels in Bot. Jahrb. Engler 29: 469, 1900; Hochr. in Ann. Cons. Jard. Bot. Gen. 4: 76, 1900; Gilg in Englers Bot. Jahrb. 34 Beibl. 75: 52, 1904; Diels in ibidem. 36 Beibl. 82: 75, 1905; Matsum. & Hayata in Jour. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 56, 1906 (Enum. Pl. Formosa); Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 428, 1910; Pampanini in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. s. 17: 432, 1910; Ulbrich ex Loes. in Beib. Bot. Central. 37 (2): 150, 1919; T. Itó, Ill. Fl. Formosa ed. 2, 479, f. 477, 1928; Liu in Bull. Peking Soc. Nat. Hist. 2 (3): 132, 1928; Hsia in Contr. Inst. Bot.