

14h. 牡丹木槿(变型)

Hibiscus syriacus Linn. f. *paeoniflorus* Gagnep. f. in Rev. Hort. Paris 1861: 132, 1861; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 54, 1955.

本变型的花粉红色或淡紫色,重瓣,直径7—9厘米。

产浙江、江西、陕西和贵州等省,均系栽培。

14i. 白花单瓣木槿(变型)

Hibiscus syriacus Linn. f. *totus-albus* T. Moore in Gard. Chron. n. s. 10, 524, f. 91, 1878; Rehd. Manual Cult. Trees & Shrubs 619, 1927, ed. 2: 629, 1940; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 54, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 230, 1979.

本变型的花纯白色,单瓣。

产台湾、福建、广东、江西、安徽、四川、云南、贵州和陕西等省,均系栽培。

14j. 紫花重瓣木槿(变型)

Hibiscus syriacus Linn. f. *violaceus* Gagnep. f. in Rev. Hort. Paris 1861: 132, 1861; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 54, 1955; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 230, 1979.

本变型的花青紫色,重瓣。

产四川、贵州、云南和西藏等省区,均系栽培。

15. 华木槿(经济植物手册) 图版 19: 4—6


Hibiscus sinosyriacus Bailey in Gentes Herb. 1: 109, 1922; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 54, pl. 19—3, 1955.

落叶灌木,高2—4米,小枝幼时被星状柔毛。叶阔楔状卵圆形,长宽各7—12厘米,通常3裂,裂片三角形,中裂片较大,侧裂片较小,基部楔形、阔楔形至近于圆形,边缘具尖锐粗齿,两面疏被星状柔毛;主脉3—5条;叶柄长3—6厘米,被星状柔毛;托叶线形,长约12毫米,被星状疏柔毛。花单生于小枝端叶腋间,花梗长1—2.5厘米,密被黄色星状绒毛;小苞片6或7,披针形,长1.7—2.5厘米,宽3—5毫米,密被星状柔毛,基部微合生;萼钟形,较小苞片为长或较短,裂片5,卵状三角形,密被金黄色星状绒毛;花淡紫色,直径7—9厘米,花瓣倒卵形,长6—7厘米,外面被星状长柔毛;雄蕊柱长4—5厘米;花柱枝5,平滑无毛。果未见。花期6—7月。

产江西庐山、湖南衡山和黔阳、贵州松桃和平坝及广西桐岭。生于海拔1000米的山谷灌丛中。本种枝多叶茂,花大型,极有观赏价值,应广为引种栽培。

本种极似木槿,主要区别在于小苞片特宽,叶较大,基部宽楔形,边缘具尖锐粗齿而相异;与贵州芙蓉不同处在于贵州芙蓉叶基部圆形、截形至微心形,和花柱枝被毛而不同。

16. 光籽木槿(秦岭植物志) 野木槿(陕西宝鸡) 图版 20



光籽木槿 *Hibiscus leiospermus* K. T. Fu & C. C. Fu: 1.花枝, 2.花萼, 3.小苞片, 4.雄蕊柱, 5.蒴果, 6.叶下面星状毛, 7.种子。(肖 溶绘)

Hibiscus leiospermus K. T. Fu & C. C. Fu in 秦岭植物志 1(3): 290, 454, 图 250, 1981.——*Hibiscus sinosyrriacus* auct. non Bailey; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 54, 1955, pro parte.

直立灌木,高 0.5—2 米,小枝幼时被星状柔毛。叶卵圆形,长 3—6 厘米,宽 2—4.5 厘米,先端钝,基部阔楔形或稍近于圆形,边缘具疏离波状圆齿,齿大或有时 3 裂,上面被星状柔毛或近于无毛,下面被星状柔毛;主脉 3 条;叶柄长 1—2.5 厘米,被短柔毛;托叶线形,长 3—4 毫米。花单生于枝端叶腋间,花梗长 2—5 毫米,被金黄色星状绒毛;总苞钟形,长 7—10 毫米,基部 1/3—1/2 处合生,密被星状柔毛,裂片 6,罕为 7,三角形,宽 3—4 毫米;萼钟形,长 2—2.5 厘米,裂片 5,三角形,锐尖,密被金黄色星状绒毛;花冠近钟形,白色至紫红色,直径 7—8 厘米,花瓣倒卵形,钝头,有脉纹,外面被星状长柔毛;雄蕊柱长约 4 厘米;花柱枝 5,密被长柔毛。蒴果长圆状椭圆形,长约 2.5 厘米,直径约 1.2 厘米,有 5 棱角,先端具喙,密被金黄色星状绒毛和长硬毛,果片 5;种子肾形,平滑无毛。花期 7—10 月。

产陕西宝鸡、略阳及甘肃崇信、镇原。生于海拔 640—1245 米的河岸灌丛或石山。在甘肃东部一带村寨常栽培作绿篱,极为普遍。

本种极似木槿,主要区别在于小苞片钟形,裂片短而宽,花梗也极短,种子平滑无毛而不同。

17. 红秋葵(华北经济植物志要) 槭葵(中国植物图鉴)

Hibiscus coccineus (Medicus) Walt. Fl. Carol. 1: 177, 1788; Hochr. in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève 4: 139, 1900; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 58, 1931; 贾祖璋,中国植物图鉴 435, 图 738, 1937; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 55, pl. 19—5, 1955; 崔友文,华北经济植物志要 313, 1953.——*Malvaviscus coccineus* Medicus Malv. 49, 1787.

多年生直立草本,高 1—3 米,茎带白霜,无毛。叶指状 5 裂,裂片狭披针形,长 6—14 厘米,宽 6—15 毫米,先端锐尖,基部楔形,边缘具疏齿,两面均平滑无毛;叶柄长 5—10 厘米,平滑无毛。花单生于枝端叶腋间,花梗长 5—8 厘米,平滑无毛,微带白霜;小苞片 12,线形,长约 2.5 厘米,宽 1—2 毫米,平滑无毛,基部微合生;萼大,叶状,钟形,直径 3—4 厘米,长约 4 厘米,裂片 5,卵圆状披针形,平滑无毛,基部 1/3 处合生;花瓣玫瑰红至洋红色,倒卵形,长 7—8 厘米,宽 3—4 厘米,外面疏被柔毛;雄蕊柱长约 7 厘米;花柱枝 5,被柔毛。蒴果近球形,无毛,直径约 2 厘米,端具短喙,果片 5,无毛;种子球形,直径约 3 毫米,疏被棕色细毛。花期 8 月。

原产美国东南部。我国北京、上海、南京等市庭园偶有引种栽培,供观赏用。

18. 芙蓉葵(云南植物志) 图版 21: 1

Hibiscus moscheutos Linn. Sp. Pl. 693, 1753; Cavan. Diss. 3: 163, t. 65,