

15. 植物体刚毛比较不发达, 小枝上刚毛与细绒毛混生。

16. 叶背基本不被刚毛。

17. 叶背粉绿色, 完全无毛或仅叶脉和脉腋上略被细绒毛 6. 变异藤山柳 *C. variabilis* C. F. Liang et Y. C. Chen

18. 叶基部浑圆形, 侧脉 8—9 对; 花径和果径均为 10 毫米左右 6a. 变异藤山柳 *C. variabilis* var. *variabilis*

18. 叶基部楔形或钝形, 侧脉 11—15 对; 花径 7—8 毫米; 果径 8 毫米左右 6b. 多脉藤山柳 *C. variabilis* var. *multinervis* C. F. Liang et Y. C. Chen

17. 叶背非粉绿色, 全面被细绒毛, 叶脉和叶柄偶见个别小刚毛 12. 广西藤山柳 *C. guangxiensis* C. F. Liang et Y. C. Chen

16. 叶背叶脉被刚毛。

19. 叶背除被刚毛外不被绒毛 13. 贵州藤山柳 *C. guizhouensis* C. F. Liang et Y. C. Chen

19. 叶背除被刚毛外复密被绒毛。

20. 叶长 3.5—5.5 厘米, 基部圆形至浅心形, 边缘每反卷; 叶柄长 2—3 厘米, 被刚毛和绒毛 14. 银花藤山柳 *C. loniceroides* C. F. Liang et Y. C. Chen

20. 叶长 7—12 厘米, 基部钝形至圆形, 边缘不反卷; 叶柄长 2—8 厘米, 基本只被刚毛, 不被绒毛 15. 榄叶藤山柳 *C. oliviformis* C. F. Liang et Y. C. Chen

15. 植物体刚毛发达; 小枝密被刚毛, 基本无绒毛。

21. 叶背和叶柄均无刚毛。

22. 叶革质, 较小, 一般最大 6×3 厘米, 腹面完全无毛 16. 四川藤山柳 *C. sichuanensis* C. Shih

22. 叶纸质, 较大, 可达 10×5 厘米, 腹面散生糙伏毛 17. 南川藤山柳 *C. nanchuanensis* W. T. Wang

21. 叶背和叶柄均有刚毛。

23. 叶背除被刚毛外复被绒毛。

24. 叶革质, 边缘反卷; 叶柄除被刚毛外复被绒毛 18. 厚叶藤山柳 *C. pachyphylla* C. F. Liang et Y. C. Chen

24. 叶纸质, 边缘不反卷; 叶柄基本只被刚毛, 不被绒毛 19. 刚毛藤山柳 *C. scandens* Maxim.

23. 叶背只被刚毛, 不被绒毛; 叶柄亦无绒毛 20. 粗毛藤山柳 *C. strigillosa* Franch.

1. 猕猴桃藤山柳 (新拟)

Clematoclethra actinidioides Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 38. 1890; Kom. in Act. Petrop. 29: 91. 1908; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 386. 1915.

老枝灰褐色或紫褐色, 无毛; 小枝褐色, 无毛或被微柔毛。叶卵形或椭圆形, 长 3.5—9 厘米, 宽 1.5—7 厘米, 顶端渐尖, 基部阔楔形、圆形或微心形, 叶缘具纤毛状齿, 很少全缘, 腹面无毛, 深绿色, 背面粉绿色, 无毛或仅在脉腋上有髯毛, 叶干后腹面枯褐色; 叶柄长 2—8 厘米, 无毛或略被微柔毛。花序柄长 1—2 厘米, 被微柔毛, 具 1—3 花; 小苞片披针形, 长 3 毫米, 或边缘具细纤毛。花白色; 萼片倒卵形, 长 3—4 毫米, 宽 3 毫米, 无毛或略被柔毛; 花瓣长 6—8 毫米, 宽 4 毫米。果近球形, 熟时紫红色或黑色, 干后直径

5—7 毫米。

分 3 变种。

1a. 猕猴桃藤山柳 (原变种)

Clematoclethra actinidioides* Maxim. var. *actinidioides

小枝无毛或薄被微柔毛。叶卵形或椭圆形,长 3.5—9 厘米,宽 1.5—4 厘米,基部阔楔形至微心形,叶缘有纤毛状小齿。花单生,花柄具微柔毛。花期 5—6 月,果期 7—8 月。

产四川、甘肃、陕西。生于海拔 2300—3000 米的山地沟谷林缘或灌丛中。模式标本采自甘肃。

1b. 全缘藤山柳 (新组合)

***Clematoclethra actinidioides* Maxim. var. *integrifolia* (Maxim.) C. F. Liang et Y. C. Chen, comb. nov.**—*Clematoclethra integrifolia* Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 38. 1890; Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 90. 1908; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 386. 1915, Journ. Arn. Arb. 9: 95. 1928.

小枝灰褐色,基本无毛。叶卵形至卵状披针形,长 3—6 厘米,宽 1—3 厘米,顶端渐尖,基部圆形或微心形,近全缘,两面无毛。花单生;花柄纤细,长 1—2 厘米,无毛。萼片无毛或稍被柔毛。花期 6—7 月,果期 7—8 月。

四川特有。生于海拔近 3000 米的混合林中。模式标本采自四川北部。

有别于原变种是叶较小,多为全缘;花柄无毛。

1c. 杨叶藤山柳 (新变种) 图版 76: 1—5

***Clematoclethra actinidioides* Maxim. var. *populifolia* C. F. Liang et Y. C. Chen in Addenda.**

小枝黄褐色,无毛。叶卵形,长 6—9 厘米,宽 4—7 厘米,顶端渐尖,基部圆形至微心形,叶缘有纤毛状锯齿,腹面除叶脉被微柔毛外,余处无毛,背面浅绿色至粉绿色,脉腋上有髯毛;叶柄长 3—8 厘米,一般 3—4 厘米,无毛。花序柄长 1—2 厘米,无毛,有花 3 朵;花柄长约 1 厘米,无毛。花期 6—7 月,果期 8—9 月。

产陕西、河南、甘肃、四川、贵州。生于海拔 1500—3900 米山地沟谷林中。模式标本采自四川理县。

有别于原变种的特征是花序通常 3 花;叶较大。

2. 银叶藤山柳 (新种) 图版 76: 6—10

***Clematoclethra argentifolia* C. F. Liang et Y. C. Chen in Addenda.**

老枝黑褐色,小枝褐色,均洁净无毛。叶卵形至长卵形,长 5—8.5 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端渐尖,基部圆形,边缘有纤毛状小锯齿,干燥后腹面银灰色,背面粉银灰色,除背面脉腋有极微弱髯毛外,余处洁净无毛;叶柄长 1.5—4.5 厘米,无毛。花序 3—7 花,基本无